


…вский, Е. Н.

…рство врачеб-
…их трав и
растений: в
2 частях

ч. 1 М., 1870

213 с.

[illegible]

с иллюст

…3.



# ЦАРСТВО
# ВРАЧЕБНЫХЪ ТРАВЪ
и
# РАСТЕНІЙ
## (ЦѢЛЕБНЫЙ ТРАВНИКЪ.)

---

СОЧ. Д-РА СМѢЛЬСКАГО.

ЧАСТЬ I. -2

МОСКВА.
1870.

# ЦАРСТВО
## ВРАЧЕБНЫХЪ ТРАВЪ И РАСТЕНІЙ.

(ЦѢЛЕБНЫЙ ТРАВНИКЪ)

## КНИГА ПРАКТИЧЕСКИХЪ СОВѢТОВЪ.

Какъ узнавать, находить, собирать и сушить врачебныя травы, корни, корки и проч. и какъ изъ нихъ приготовлять лекарства: декокты, настои, пластыри, мази, соки, и т. п.; и, какъ ихъ употреблять отъ различныхъ болѣзней и для того, чтобъ продлить

## ЧЕЛОВѢЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ.

*Соч. доктора Смѣльскаго.*

Съ политипажными рисунками въ текстѣ и особымъ приложеніемъ состоящемъ изъ лекарстяенныхъ изображеній по которымъ можно безъ ошибочно отличать врачебныя травы отъ ядовитыхъ.

**ВЪ 2-ХЪ ЧАСТЯХЪ.**

Часть I. ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ТРАВНИКЪ.

Часть II. НАРОДНОЕ ВРАЧЕВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.

МОСКВА.
Изданіе книгопродавца Леухина
1870.

Дозволено цензурою. Москва. Іюня 22-го, 1870 года.




Типографія М. П. Погодина, на Дѣвичьемъ полѣ, въ собств. домѣ.

## КНИГА ИМЕЕТ

| Листов печатных | Выпуск | В перепл. един. соедин. №№ вып. | Таблиц | Карт | Иллюстр. | Служебн. №№ | №№ списка и порядковый | 195 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | | 2-1-2 | | | 12- | + | 369 / 321 | 60 |



16/I—100000



## СБОРЪ РАСТЕНІЙ.

*Стебли и листья.* Ихъ срываютъ въ то время, когда растеніе находится во всей своей силѣ, т. е., когда цвѣты начинаютъ распускаться, и дѣйствительно, первые побѣги и листья бываютъ не хороши и приготовленное изъ нихъ лекарство не приноситъ пользы.

Вскорѣ по развитіи почекъ, въ растеніи преобладаютъ сладкія, слизистыя начала, которыя съ теченіемъ времени переходятъ въ горькія, ѣдкія, наркотическія. Слѣдовательно, всѣ слизистыя растенія, напр., буквица, гораздо богаче мягчительными началами въ началѣ весны, чѣмъ лѣтомъ, и потому ихъ надобно срывать не только до цвѣтенія, но даже до совершеннаго образованія стеблей. Всякое растеніе надобно срывать утромъ или въ полдень, въ хорошую погоду. Сорванныя въ дурное время растенія подвергаются плѣсени и теряютъ часть аромата.

*Цвѣты.* Срываются прежде совершеннаго распусканья, потому что въ это время они сохраняютъ больше запаху, слѣдовательно, болѣе дѣйствительны. Тоже самое надобно сказать и о сбираніи цвѣтущихъ верхушекъ.

*Плоды.* Назначаемые къ употребленію въ свѣжемъ видѣ срываются совершенно зрѣлыми; подвергаемые же сушенью должны быть нѣсколько недозрѣвшіе.

*Побѣги.* Ихъ срѣзываютъ весною до развитія листьевъ, или осенью послѣ опаденія послѣднихъ. Дерево не должно быть ни очень старое, ни больное.

*Корни.* Корни одно-или-двулѣтнихъ растеній вырываются осенью, многолѣтнихъ—весною. Во всякомъ случаѣ, растеніе должно имѣть хорошую пищу, а корни быть здоровые, гибкіе, т. е., чтобы деревянистая ихъ часть не приняла еще твердости, къ которой она предрасположена. Впрочемъ, сюда не относятся корни, съ которыхъ употребляется только кора; такіе корни вырываютъ тогда только, когда кора достигла извѣстной толщины и свободно отдѣляется отъ деревянистой сердцевины.

*Кора.* Снимаютъ не очень старую и не очень толстую; главное условіе при выборѣ дерева состоитъ въ томъ, чтобы оно было здорово и имѣло густые листья.

## СУШЕНЬЕ РАСТЕНІЙ.

Сочныя растенія немедленно подвергаются сушенью. Ихъ разсыпаютъ тонкимъ слоемъ на ивовыхъ плетенкахъ, покрытыхъ сѣрою бумагой, или на желѣзныхъ рамахъ, обтянутыхъ холстомъ, и ставятъ на солнце, или въ печь, температура которой равняется 30—35 град. Растенія переворачиваютъ руками нѣсколько разъ въ день, чтобы они ровнѣе высыхали. Степень сухости опредѣляется совершенною негибкостью и ломкостью при растираніи въ рукахъ. Не очень сочныя растенія требуютъ для сушенья менѣе жара, а потому ихъ надобно сушить при меньшей степени жара.

## ЦВѢТЫ И ЦВѢТУЩІЯ ВЕРХУШКИ.

Не сочные сушатъ въ тѣни, навязавъ ихъ пучками и обернувъ бумагой; сочные же сушатъ тотчасъ послѣ сбора на солнцѣ, или въ печи.

*Сѣмена.* Масляныя и мучнистыя сѣмена сушатъ на хорошо провѣтриваемомъ чердакѣ, или въ теплой печи, разсыпавъ на бумагѣ, часто перемѣшивая и переворачивая ихъ руками.

*Плоды.* Мясистые плоды не высушиваются совсѣмъ, а только вялятся; для этого ихъ подвергаютъ сперва дѣйствію тепла, а потомъ жара, до тѣхъ поръ, пока они не достигнутъ желаемой плотности.

*Кора, побѣги и корни.* Тонкіе и волокнистые не представляютъ при сушеньи ни малѣйшаго затрудненія; шишковатые и маслистые корни разрѣзываютъ на тонкіе ломтики, нанизываютъ на нитку и вѣшаютъ въ печи. Луковичные корни, особенно крупные, сохнутъ не скоро; сперва снимаютъ съ нихъ шелуху, разрѣзываютъ вдоль на тонкіе ломтики и вѣшаютъ въ печи до тѣхъ поръ, пока они совсѣмъ высохнутъ.

## СОХРАНЕНІЕ РАСТЕНІЙ.

Хорошо высушенныя растенія складываютъ въ ящики, или банки и плотно завязываютъ, чтобы предохранить отъ свѣта, воздуха и насѣкомыхъ.

## ВРЕМЯ СБОРА ЛЕКАРСТВЕННЫХЪ РАСТЕНІЙ.

*Январь.*

*Февраль.* На югѣ Россіи, въ концѣ февраля, начинають собирать фіялки, первоцвѣтъ и т. п.

*Мартъ.* На югѣ Россіи, собираютъ побѣги тополя, цвѣты персика, фіялки, бѣлокопытника.

*Апрѣль.* Собираютъ молодые побѣги ели, а на югѣ—цвѣты бѣлой крапивы.

*Май.* Собираютъ полынь, омегъ, крессъ-салатъ, будру, фіялку трехцвѣтную, медунку, бѣлую розу, хрѣнъ.

*Іюнь.* Собираютъ чернобыльникъ, дикую петрушку, листья огуречной травы, сывороточную траву, волосатикъ, листья наперстянки, дымянку, укропъ, дубровку, просвирку, бѣлену, латукъ, вишневый лавръ, желудникъ, стѣнницу, *барвенокъ*, одуванчикъ, подорожникъ, истодъ, ежевику, шиповникъ, мыльнянку, скабіозу, желѣзнякъ; цвѣты дикаго мака, ромашки, дрока, померанца, липы, бузины.

*Іюль.* Сушатъ вишню; собираютъ листья и цвѣтущія верхушки полыня, гусиной лапы, иссопа, майорана, проскурняка, мелиссы, донника, мяты, тысячелистника, розмарина, руты, шалфея, богородицкой травы, ползучаго тимьяна, лабазника; собираютъ цвѣты васильковъ, огуречной травы, каприфолія, лаванды, просвирки, гвоздики, бѣлой крапивы, піоновъ и дикаго мака. Сушатъ головки мака.

*Августъ.* Собираютъ листья псинки, орѣшины; цвѣты царскаго скипетра, большаго просвирняка, хмѣля, сѣмена аниса и кишнеца.

*Сентябрь.* Собираютъ корни ангелики, спаржи, змѣевика игольной травы, *палечной* травы, укропа, цикорія, папоротника, *просвирняка*, ириса, конскаго щавеля, піоновъ, хрѣна, солодковаго корня, завязнаго корня, бѣлокопытника; листья жгучей крапивы; ягоды жидовской вишни, бузины, придорожной иглы, шиповника, дикой розы, шелковицы, айву, верескъ.

*Октябрь.* Выкапываютъ корни ольховника, репейника, песьяго языка, ревеня, малинника, мыльнянки, валеріаны; собираютъ дубовые листья.

*Ноябрь.* Выкапываютъ луковицы безвременника, лиліи, морскаго лука и нарциссовъ.

*Декабрь.*

## КЛАССИФИКАЦІЯ РАСТЕНІЙ ПО ИХЪ СВОЙСТВАМЪ.

*Мягчительныя* и *пекторальныя*, или *грудныя*. Тѣ растенія, которыя имѣютъ мягчащія, разрѣшающія свойства. Ихъ называютъ *грудными* или *пекторальными*, когда они употребляются преимущественно въ грудныхъ болѣзняхъ. Способъ употребленія ихъ: настой, декоктъ, промывательное, примочка, припарка, ванна.

## Мягчительныя.

Сладкій миндаль.
Арорутъ.
Волосатикъ.
Палечная трава.
Сальный корень.
Грудная ягода.
Ленъ.
Ячмень.
Солодка.
Бѣлокопытникъ.
Дикій макъ.
Песій языкъ.
Финики.
Водоросль.
Просвирка.
Исландскій мохъ.
Просвирнякъ.
Виноградъ.
Рисъ.
Фіялка.

## Грудныя или пекторальныя.

Девясилъ.
Побѣги ели.
Кервель.
Иссопъ.
Ирисъ.
Истодъ.
Фіялка.
Мята.
Волосатикъ.
Богородицкая трава.
Ипекакуана.
Будра.
Бѣлокопытникъ.

*Успокоивающія* имѣютъ свойства уменьшать и утолять страданіе и останавливать раздраженіе и воспаленіе; дѣйствіе ихъ сильнѣе мягчительныхъ. Ихъ раздѣляютъ на *одуряющія* или *наркотическія* и *противоспазматическія*.

### Одуряющія или наркотическія.

Аконитъ.
Вишневый лавръ.
Омегъ.
Бѣлена.
Макъ.
Латукъ.
Белладонна.
Наперстянка.
Псинка.
Конскій укропъ.

### Противоспазматическія.

Лавръ вишневый.
Луговой нарциссъ.
Піонъ.
Валеріана.
Мелисса.
Померанецъ.
Липа.

*Слабительныя или послабляющія* дѣлятся на послабляющія и рвотныя.

### Рвотныя.

Ипекакуана.

### Послабляющія.

Квассія.
Безвременникъ.
Придорожный молочай.
Придорожная игла.
Клещевина.
Вьюнокъ.
Цикорій.
Колоцинтъ.
Молочайникъ.
Персиковый цвѣтъ.
Яляппа.
Пролѣска.

Груши. Чернославъ.
Ревень. Скаммоній.
Александрійскій листъ. Тамариндъ.

*Возбуждающія* имѣютъ свойства придавать силу и энергію и употребляются въ питьяхъ, настояхъ, промывательныхъ и примочкахъ.

Гвоздика. Баранья трава.
Померанецъ. Девясилъ.
Полынь. Бадьянъ.
Чеснокъ. Мята англійская.
Ангелика. Тысячелистникъ.
Анисъ. Мята.
Чернобыльникъ. Побѣги ели.
Кофе. Ромашка.
Корица. Полевой тминъ.
Кашкара. Лимонная корка.
Ложечная трава. Крессъ-салатъ.
Иссопъ. Лавендула.
Можжевельникъ. Бѣлокопытникъ.
Инбирь. Желудникъ.
Мелисса. Индѣйскій перецъ.
Перецъ. Истодъ.
Палей. Хрѣнъ.
Розмаринъ. Шафранъ.
Шалфей. Чай.
Змѣиная трава. Тминъ.
Ваниль. Желѣзнякъ.

*Вяжущія*. Имѣютъ свойство сжимать ткани нашего тѣла, съ которыми они приходятъ въ соприкосновеніе. Употребляются для полосканій, настоевъ, питей, промывательныхъ и ваннъ.

| | |
|---|---|
| Лапушникъ. | Черника. |
| Черемуха. | Смолка. |
| Девясилъ. | Гравилатъ. |
| Горецъ. | Васильки. |
| Сальный корень. | Катеху. |
| Сывороточная трава. | Дубъ. |
| Айва. | Шильникъ. |
| Гранатъ. | Плаунъ. |
| Донникъ. | Одноцвѣтъ. |
| Миртъ. | Чернильный орѣхъ. |
| Жгучая крапива. | Первоцвѣтъ. |
| Шиповникъ. | Гусиная трава. |
| Ратанія. | Тернъ. |
| Красныя розы. | Красный щавель. |
| Рябина. | |

*Тоническія* придаютъ силы и укрѣпляютъ; отличаются отъ возбуждающихъ болѣе продолжительнымъ дѣйствіемъ. Всѣ возбуждающія лекарства въ тоже время и тоническія.

| | |
|---|---|
| Какао. | Золототысячникъ. |
| Катеху. | Чертополохъ. |
| Кофе. | Дубровка. |
| Хмѣль. | Остролистъ. |
| Исландскій мохъ. | Водяная трефоль. |

| | |
|---|---|
| Дубовая кора. | Желуди. |
| Лимонная корка. | Одноцвѣтъ. |
| Дымянка. | Корень горечавки. |
| Померанц. корка. | Горькая квассія. |
| Хина. | Квассія симаруба. |

*Потогонныя* употребляются какъ чай, въ видѣ настоя.

| | |
|---|---|
| Репейникъ. | Огуречная трава. |
| Буксовое дерево. | Безвременникъ. |
| Дулькамара. | Дымянка. |
| Бакаутъ. | Вязъ. |
| Конскій щавель. | Сальсапарель. |
| Мыльнянка. | Сассафрасъ. |
| Скабіоза. | Змѣевикъ. |
| Бузина. | Бѣлокопытникъ. |
| Индѣйскій нардъ. | |

*Мочегонныя* употребляются въ видѣ настоя, промывательнаго, припарки на животъ.

| | |
|---|---|
| Дикая петрушка. | Жидовская вишня. |
| Спаржа. | Огуречная трава. |
| Игольная трава. | Бакаутъ. |
| Каприфолій. | Остролистъ. |
| Земляника. | Дрокъ. |
| Верескъ. | Ленъ. |
| Стѣнница. | Петрушка. |
| Буквица — первоцвѣтъ. | Одуванчикъ. |
| Хрѣнъ. | Можжевеловыя ягоды. |

Палечная трава.
Наперстянка.
Солодка.
Морской лукъ.
Безвременникъ.
Укропъ.
Лабазникъ.
Кора бузины.

*Освѣжающія — ослабляющія противовоспалительныя* употребляются въ питьяхъ.

Вишни.
Лимонъ.
Смородина.
Померанцы.
Яблоки.
Палечная трава.
Малина.
Шелковица.
Щавель.
Солодка.

*Глистогонныя* употребляются въ питьѣ, промывательныхъ, кашкѣ, припаркахъ, втираньяхъ.

Полынь.
Лукъ.
Папоротникъ.
Корсиканскій мохъ.
Цитварное сѣмя.
Пижма.
Чеснокъ.
Лапушникъ.
Корка гранатная.
Кора шелковичная.
Куссо.

*Противозолотушныя* горькія, тоническія, укрѣпляющія. Такъ какъ золотуха есть болѣзнь, происходящая отъ худосочія, и слѣдовательно отъ слабости сложенія, то и должна быть пользуема тоническими средствами. Такимъ образомъ, всѣ укрѣпляющія средства будутъ противозолотушными. Ихъ употребляютъ въ видѣ питья и ваннъ.

Кофе. | Омегъ.
Крессъ-салатъ. | Псинки.
Орѣшникъ | Хина.
Хрѣнъ. | Водоросль.
Хмѣль.

## ПРИГОТОВЛЕНІЕ НАСТОЯ.

Кладутъ въ чайникъ горсть, или болѣе травы и заваривають кипяткомъ какъ чай; накрываютъ чайникъ, даютъ стоять извѣстное время, потомъ процѣживаютъ и употребляютъ.

Настаиванье травъ, цвѣтовъ и вообще веществъ нѣжныхъ, продолжается 15-20 минутъ, а настаиванье грубыхъ веществъ, напр., корней, болѣе продолжительное время. Обыкновенно настой употребляется въ видѣ чая, но не должно передерживать его на самоварѣ, или оставлять траву на долго въ кипяткѣ, потому что тогда это уже будетъ не настой, а отваръ.

## ХОЛОДНОЕ НАСТАИВАНЬЕ.

Наливаютъ извѣстное растеніе холодною водой, и оставляютъ стоять болѣе или менѣе продолжительное время.

## ОТВАРЪ.

Этотъ способъ, который часто смѣшиваютъ съ холоднымъ настаиваньемъ, заключается въ томъ, что извѣстное вещество кладутъ въ воду, нагрѣтую до самой высокой степени. На-

стой этого отвара продолжается, смотря по надобности и свойству лекарства, различное время.

## ДЕКОКТЪ.

Декокты не въ большемъ употребленіи, во-первыхъ потому, что они усиливаютъ дѣйствіе приготовленныхъ медикаментовъ, во-вторыхъ, потому что передаютъ въ настой или питье горькія и вяжущія начала, иногда очень вредныя. Кипяченье декокта можетъ продолжаться произвольное количество времени. Когда говорятъ, что декоктъ уварился на двѣ трети, на три четверти, то это значитъ, что теряютъ одну треть, одну четверть декокта, вслѣдствіе испаренія жидкости.

## ОПИСАНІЕ РАСТЕНІЙ, ИХЪ СВОЙСТВЪ И ДѢЙСТВІЙ.

### АВРАНЪ.

Дикое многолѣтнее растеніе, находимое по всей Россіи; употребляется корень.

*Запаху* не имѣетъ.

*Вкусъ* чрезвычайно горькій отвратительный, слабѣе въ высушенномъ растеніи.

*Свойство* слабительное, потогонное, а иногда рвотное, глистогонное.

Стебель суставчатый, прямой, величиною полтора фута, 4-гранный вверху, голый, сочный; листья сидячіе, ланцетовидные; цвѣтки бѣлые или красноватые, безъ запаху.

## АЛЕКСАНДРІЙСКІЙ ЛИСТЪ.

Получается отъ двухъ видовъ кассіи, именно, отъ Cassia lanceolata, растущей въ Абиссиніи, Египтѣ, Нубіи и другихъ разныхъ странахъ, и отъ Cassia obovata, растущей въ Египтѣ верхнемъ, Каирѣ и Нубіи.

*Запахъ* не совсѣмъ пріятный.

*Вкусъ* горьковатый, отвратительный, камедистый, островатый. Составныя части Александрійскаго листа слѣдующія: камедь, масло жирное и летучее, бѣлковина, катартинъ, слизь и нѣкоторыя соли. Своимъ слабительнымъ свойствомъ Александрійскій листъ обязанъ алкалоиду, катартину.

*Свойство* слабительное, усиливающее перистальтическое движеніе кишекъ; въ малыхъ дозахъ усиливаетъ выдѣленіе слизистой оболочки легкихъ. Въ числѣ слабительныхъ занимаетъ самое низшее мѣсто.

Форма листьевъ яйцевидная, ланцетообразная, продолговатая; цвѣтъ сверху желто-зеленый, снизу, сѣровато-зеленый.

## АНГУСТУРА.

Отечество Южная Америка, по берегамъ Ориноко. Растеніе даетъ кору ангустуры, которая содержитъ эѳирное масло, смолу, куспаринъ, камедь, слизь. Настоящая кора ангустуры имѣетъ видъ плоскихъ или желобоватыхъ кусковъ, длиною въ 6 дюймовъ; покрыта темно-сѣрою морщинистою кожей; цвѣтъ самой коры буровато-желтый.

*Запахъ* непріятный затхлый.

*Вкусъ* пряно-горькій и слегка острый.

*Свойство* тоническое, возбуждающее, и потому кора ангустуры употребляется преимущественно противъ перемежающейся лихорадки, поносовъ, происходящихъ отъ слабости слизистой оболочки кишекъ.

## АНИСЪ.

Отечество Египетъ, Греція, Сирія, теперь распространенъ повсемѣстно. Даетъ анисовое сѣмя, которое содержитъ эфирное масло, жирное масло, стеаринъ, смолу, анизульминъ, гуммоинъ, гликозу и соли.

*Запахъ* сильно-ароматный, анисовый.

*Вкусъ* сладковатый, слегка пряный.

*Свойство.* Дѣйствуетъ преимущественно на желудокъ и кишечный каналъ, и употребляется при ихъ болѣзняхъ, особенно при вѣтрахъ у дѣтей.

## АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ.

Отечество Европа, Сѣверная Америка; даетъ траву анютиныхъ глазокъ (Herba violae tricoloris;) содержитъ віолинъ, желтое красящее начало и растительную чернильно-орѣшковую кислоту. Дѣйствуетъ преимущественно на кожу и почки и съ пользою употребляется противъ накожныхъ сыпей.

## АЙВА.

Отечество Южная Европа, доставляетъ квитовое сѣмя, содержащее много слизи, жирное масло. Сѣмена имѣютъ

видъ продолговато-яйцеобразный, снаружи бурыя, внутри бѣлыя, съ одного конца тупыя, съ другаго заостренныя.

*Запаху* не имѣютъ.

*Вкусъ* слизистый.

*Дѣйствіе* слизистое, и потому квитовое сѣмя употребляется какъ слизистое средство внутрь и снаружи.

## АГАРИКЪ ЛИСТВЕННИЧНЫЙ.

Грибъ различной формы; вещество гриба губчатое; цвѣтъ бѣлый.

*Запахъ* слабый.

*Вкусъ* горькій, непріятный.

## БАГУЛЬНИКЪ.

Отечество Европа, ея мшистыя и болотистыя мѣста; даетъ багульниковую траву, содержащую хлорофилъ, эѳирное масло, дубильную кислоту и т. д. Листья ланцетовидные, съ краевъ загнутые къ низу, сверху темнозеленые, гладкіе, снизу покрыты буроватыми волосками; цвѣты бѣлые.

*Запахъ* свѣжей травы противный, одуряющій.

*Вкусъ* горько-вяжущій.

*Дѣйствіе* слегка наркотическое, одуряющее.

## БАДЬЯНЪ.

Отечество Китай, Филиппинскіе острова, Японія; доставляетъ сѣмя бадьяна или звѣздчатаго аниса, которое содер-

житъ эѳирное масло, зеленое жирное жгучее на вкусъ масло, смолу, taнинъ, вытяжное вещество, камедь, бензое и яблочную кислоту.

*Запахъ* и *вкусъ* пріятные.

*Дѣйствіе* такое, какъ обыкновеннаго аниса, по слабѣе.

## БАЗАЛИКЪ.

Отечество Персія, Остъ-Индія; доставляетъ траву, нынѣ почти не употребляемую.

## БАККАУТЪ.

Отечество Вестъ-Индія; доставляетъ дерево и смолу баккаутныя; смола есть самъ собою вытекшій изъ надрѣзовъ на корнѣ сокъ, отвердѣвшій впослѣдствіи; она содержитъ особенное экстрактивное вещество, слизистое вытяжное вещество, яблочнокислую известь, твердую смолу, росно-ладонную кислоту, и т. д. Дерево твердое, плотное, волокнистое; снаружи цвѣтъ желтоватый, внутри зеленовато-бурый.

*Запахъ* слабый, при сожиганіи ароматный.

*Вкусъ* горькій, смолистый, слегка раздражающій.

*Дѣйствуетъ* преимущественно на кожу и почки.

## БАРАНЧИКЪ, АРНИКА.

Отечество почти вся Европа, особенно Швейцарскія Альпы; доставляетъ корень и цвѣты. Корень содержитъ острую смо-



лу, эѳирное масло, экстрактивное вещество, танинъ, слизь, воскъ, камедь; цвѣты содержатъ эѳирное масло, бѣлковину, желтое красящее начало, арницинъ, чернильно-орѣшковую кислоту, камедь и соли.

*Запахъ* тяжелый.

*Вкусъ* острый, горьковатый.

*Свойство* корня возбуждающее, тоническое, противогнилостное; цвѣты дѣйствуютъ возбуждающимъ образомъ на нервую систему и тоническимъ на слизистую оболочку, поэтому употребляются при болѣзняхъ, ушибахъ и пораженіяхъ головы.

## БАРБАРИСЪ.

Отечество Европа; доставляетъ барбарисныя ягоды, сокъ которыхъ употребляется для барбариснаго сиропа; содержатъ берберинъ, гликозу, яблочную, лимонную и винокаменную кислоту.

## БЕДРЕНЕЦЪ.

Отечество Европа; доставляетъ бедренцовый корень, содержащій эѳирное масло, смолу, экстрактивное вещество, кристаллическій сахаръ и гликозу, камедь, растительный жиръ. Форма корня цилиндрическая, строеніе снаружи кольчатое,

цвѣтъ буровато-сѣрый, а внутри блѣдно-сѣрый съ бѣлыми точками.

*Запахъ* непріятно ароматный.

*Вкусъ* свѣжаго корня щиплющій, острый, горько-пряный.

Прежде употреблялся противъ хроническаго катарра кишечнаго канала и легкихъ. Тинктура бедренцовая оказалась хороша для полосканья горла при жабѣ (anguina tonsillaris).

## БЕЗВРЕМЕННИКЪ.

Отечество вся Европа; доставляетъ сѣмя и корень, содержащіе колхицинъ, олеинъ, стеаринъ, желтое красящее начало, много инулина, камеди и т. д.; сѣмена дѣйствуютъ лучше корня.

Корень имѣетъ видъ мясистой сочной луковицы, съ одной стороны выпуклой, съ другой приплюснутой; цвѣтъ снаружи желтый, внутри бѣлый. Сѣмена кругловаты, морщинисты; свѣжія имѣютъ цвѣтъ бѣлый, а сухія чернобурый.



*Запахъ* свѣжаго корня похожъ на рѣдечный; у сѣменъ запаху нѣтъ.

*Вкусъ* корня и сѣменъ сначала сладковатый, а потомъ остро-горькій, непріятный.

*Дѣйствуетъ* преимущественно на кишки, гдѣ большіе пріемы могутъ произвесть сильное воспаленіе съ смертельнымъ исходомъ. Употребляется въ водянкѣ, какъ мочегонное, и противъ подагры и ревматизма. Лучшая форма винная настойка и тинктура.

## БИРЮЧИНА.

Отечество Южная Европа, Остъ-Индія; доставляетъ грудныя ягоды, которыя часто употребляются для грудныхъ наборовъ.

## БЛОШНОЕ СѢМЯ.

Многолѣтнее растеніе, прозябающее во множествѣ по песчанымъ мѣстамъ около Дона, Куманска, въ Калмыцкихъ степяхъ.

*Запаху* сѣмя не имѣетъ.

*Вкусъ* сначала отвратительный слизистый, а потомъ острый.

*Свойство* мягчительное.

## БОБЫ СВ. ИГНАТІЯ.

Отечество Филиппинскіе острова. Бобы очень богаты стрихниномъ, бруциномъ, желтымъ красящимъ началомъ, камедью, слизью, амилемъ. Сѣмена въ длину и ширину имѣютъ по 1 дюйму, нѣсколько сжаты; съ одной стороны выпуклыя, а съ другой угловаты, вещество ихъ плотно, роговидно; сна-

ружи пушистые; цвѣта свѣтло-буроватаго, внутри бѣловаты, или зеленовато-сѣры.

*Вкусъ* весьма горькій.

*Свойство* ядовитое, такое же, какъ у цѣлибухи.

## БОГОРОДСКАЯ ТРАВА.

Полукустарникъ въ сѣверной Россіи и Сибири, въ дикомъ состояніи.

*Запахъ* проницательный, пріятный.

*Вкусъ* пряный горьковатый.

*Свойство*. Укрѣпляетъ нервы, гонитъ мочу, разрѣшаетъ.

## БОЛИГОЛОВЪ, ОМЕГА.

Отечество вся Европа, Сѣверная Америка; доставляетъ траву омеги, содержащую коніинъ, острое летучее масло, восковую смолу, бѣлковину, соли.—Стебель прямой, въ 3, 4 фута вышины, цилиндрическій, зубчатый, покрытъ бороздками и синеватыми полосками, ниже которыхъ цвѣтъ блестящій, зеленый. Весь стебель, особенно книзу, по-



крытъ множествомъ красноватыхъ, или краснобурыхъ пятнышекъ, гладокъ, вѣтвистъ. Листья сверху темнаго, а снизу блѣднаго зеленаго цвѣта. Цвѣтки бѣлые.

*Запахъ* травы противный, одуряющій, похожій на запахъ кошачьей мочи.

*Вкусъ* отвратительный, горько-острый.

*Дѣйствуетъ* на нервную систему, можетъ произвести рвоту, потомъ головокруженіе, дрожаніе членовъ и отравленіе. Употребляются противъ опухолей железъ, золотухи, золотушной свѣтобоязни, затвердѣлаго рака и карциномы.

## БУЗИНА.

Отечество вся Европа; доставляетъ бузинные цвѣты, многочисленные, въ видѣ кистей, цвѣта желтовато-бѣлаго; содержатъ эфирное масло, сѣру, протеиновое экстрактивное начало, смолу, клейковину, бѣлокъ.

*Запахъ* сильный, непріятный, бузинный, особенно у свѣжихъ цвѣтовъ.

*Вкусъ* слизисто-горьковатый.

*Дѣйствіе* легкое потогонное.

## БУККЪ.

Отечество Южная Африка, но воздѣлывается въ Европѣ; доставляетъ букковые листья, содержащіе эѳирное масло, экстрактивное начало, камедь, смолу, діозминъ. — Листья

продолговатые, обратно-яйцевидные, длиною въ 1 дюймъ, шириною до 5 линій, съ зазубренными краями, цвѣта сверху зеленовато-желтаго, снизу болѣе свѣтлаго.

*Запахъ* сильный, ароматный.

*Вкусъ* горьковатый, напоминающій мяту.

*Дѣйствуетъ* преимущественно на моче-половые органы и употребляется противъ болѣзней этихъ органовъ, а также противъ застарѣлаго ревматизма.

## БЫЧАЧЬЯ ТРАВА.

Отечество Европа; доставляетъ корень бычачьей травы, содержащій амиль, бѣлокъ, горькое начало, ононидъ, жирное масло, смолу.—Форма корня цилиндрическая, снаружи цвѣтъ буро-сѣрый, внутри бѣлый.

*Запаху* не имѣетъ.

*Вкусъ* острый, вяжущій.

*Дѣйствуетъ* какъ слабое мочегонное; хорошо дѣйствуетъ и при застарѣломъ ревматизмѣ.

## БѢЛЕНА, БЛЕКОТА.

Отечество вся Европа; доставляетъ бѣленную траву, содержащую гіосціаминъ, жирное масло, воскъ, экстрактивное вещество, растительный бѣлокъ, камедь, крахмалъ и соли. Стебель прямой, вѣтвистый, мохнатый, вышиною до



двухъ футовъ, листья продолговато-яйцевидные, перисто-выемчатые, липкіе, шероховатые, цвѣта темнозеленаго. Сѣмена маленькія, кругловатыя, почкообразныя, немного сжатыя, съ мелкими точками, морщинистыя, желто-сѣраго цвѣта, внутри бѣловатыя.

*Запахъ* листьевъ противный, одуряющій.

*Вкусъ* листьевъ и сѣменъ противный, горьковатый.

*Дѣйствуетъ* преимущественно на мозгъ и органы чувствъ, и употребляется при неврозахъ, нервномъ удушьѣ и при всѣхъ другихъ болѣзняхъ, которыя характеризуются судорогами и болями легочной и сердцевой системъ; расширяетъ зрачекъ. Снаружи употребляется какъ успокоивающее средство.

## БѢЛОКОПЫТНИКЪ, МАТЬ И МАЧИХА.

Многолѣтнее растеніе, встрѣчающееся по всей Европѣ на глинистыхъ мѣстахъ; доставляетъ цвѣты и траву бѣлокопытника, содержащіе слизистое, дубильное, горькое и экстрактивное начала, соли.

*Запахъ* листьевъ слабый, у цвѣтовъ слегка ароматный.

*Вкусъ* клейкій, слегка вяжущій, у цвѣтовъ сладковатый.

*Дѣйствуетъ*, какъ смягчающее, средство.

## ВАХТА.

Отечество Россія и Сибирь, ихъ болотныя и влажныя мѣста; растеніе многолѣтнее, доставляющее траву.

*Запаху* не имѣетъ.

*Вкусъ* очень горькій.

*Свойство* противогнилостное, глистогонное.

## ВЕРБИШНИКЪ, ЦАРСКІЙ СКИПЕТРЪ.

Отечество Сѣверная и средняя Европа; доставляетъ траву и *цвѣты царскаго скипетра*, содержащіе желтое эфирное масло, кислую жирную зеленую субстанцію, смолистое, желтое красящее вещество, воскъ, камедь, гликозу, фосфорную и яблочную кислоты, какъ свободныя, такъ соединенныя съ известью, сѣру, аммоніакъ.—Листья продолговато-ланцетообразные, сверху волнистые, снизу жилистые, края зазубрены, цвѣтъ блѣдно-зеленый; вѣнчики желтые, воронко-образные, однолистные, пятилепестные.

*Запахъ* свѣжихъ цвѣтовъ непріятный, слегка одуряющій; у сухихъ слегка медовый.

*Вкусъ* сладковато-слизистый.

*Употребляется* въ видѣ слизистаго настоя или отвара противъ катаррального пораженія слизистой оболочки дыхательныхъ и пищеварительныхъ органовъ.

## ВАЛЕРІАНА, МАУНЪ.

Валеріана, земляной ладонъ, балдріянъ, маунъ, кошачья трава, растетъ по лѣсамъ, лугамъ и берегамъ рѣкъ, но лучшею считается растущая на возвышенностяхъ. Доставляетъ валеріановый корень, содержащій эѳирное масло, валеріановую кислоту. — Корень валеріаны имѣетъ видъ продолговато-округленнаго стержня, покрытаго мочками; цвѣтъ свѣжаго корня бѣловатый, а сухаго буровато-сѣрый.



*Запахъ* сильный, непріятный, напоминающій запахъ кошачьей мочи.

*Вкусъ* горько-острый, непріятный, пряный.

*Дѣйствуетъ* премущественно на нервную систему, какъ средство возбуждающее, нервно-тоническое, унимающее судороги, и употребляется противъ нервныхъ болѣзней, истерики, падучей.

## ВАНИЛЬ.

Отечество Южная Америка, новая Гренада, Перу, Мехика;

доставляетъ ванильные стручки, содержащіе экстрактивное начало, жирное масло, смолу, сахаръ, коричневую кислоту, амиль, камедь, соли.

*Запахъ и вкусъ* ванили всѣмъ извѣстны.

*Дѣйствуетъ* какъ средство возбуждающее, и употребляется снаружи при безсиліи и недостаточномъ мѣсячномъ очищеніи.

## ВЕРБЛЮЖЬЯ ТРАВА, ГУНБА.

Отечество Египетъ, малая Азія, Южная Европа; доставляетъ сѣмя, содержащее эѳирное масло, жирное масло, слизь; употребляется для катаплазмъ, какъ разрѣшающее средство.

## ВЕРОНИКА.

Отечество Германія, Франція; доставляетъ траву вероники.

*Запаху* почти не имѣетъ.

*Вкусъ* горьковатый, немного вяжущій.

*Употребляется*, какъ тоническое стягивающее средство, преимущественно при хроническомъ катаррѣ, въ видѣ чая и выжатаго сока.

## ВИННАЯ ЯГОДА.

Отечество Востокъ, но воздѣлывается и въ Южной Европѣ; доставляетъ фиги, винныя ягоды, богатыя сахаромъ и слизью; употребляются, какъ средство смягчающее и способствующее отдѣленію мокроты.

## ВИНТЕРОВА КОРКА.

Имѣетъ форму трубчатыхъ кусковъ, буроватаго цвѣта, неровная, съ пятнами и углубленіями.

*Запахъ* ароматный, напоминающій перецъ и корицу.

*Вкусъ* пряно-жгучій.

*Употребляется* какъ средство возбуждающее, противогнилостное, противо-цинготное, укрѣпляющее желудокъ.

## ВИНОГРАДЪ.

Отечество сперва Азія, потомъ Европа; доставляетъ вѣтви и листы, изъ которыхъ добывается стягивающій экстрактъ, и вино, содержащее энантовый эѳиръ, алкоголь, воду, сахаръ, экстрактивное начало, кали, винокислую известь, сѣрнокислое кали, хлористый натрій, камедь, свободную уксусную кислоту. Умѣренно употребляемое, вино служитъ превосходнымъ средствомъ особенно въ періодъ слабости и во время выздоровленія послѣ многихъ болѣзней. Снаружи чаще употребляется красное вино по причинѣ его стягивающаго свойства. Изъ винограда же приготовляется крупный и мелкій изюмъ, употребляемый для слизистаго разводящаго питья.

## ВИШНЯ.

Отечество Востокъ, воздѣлывается въ Европѣ; доставляетъ кислыя вишни, содержащія лимонную кислоту, лимонно-кислую известь и кали; употребляются для приготовленія воды

и сиропа вишневыхъ. При добыванiи воды берутъ также и косточки, содержащiя немного синильной кислоты.

## ВИШНЕВЫЙ ЛАВРЪ.

Отечество Сирiя, Персiя, но воздѣлывается и въ Южной Европѣ; доставляетъ лавро-вишневые листья, которые, при перегонкѣ съ водою, даютъ лавровишневую воду. Она содержитъ эѳирное масло, богатое синильною кислотой, горькое экстрактивное вещество, танинъ.—Листья продолговато-ланцетовидные, *попеременные*, заостренные, цвѣтъ постоянно зеленый.



*Запахъ* ароматный, похожiй на запахъ горькаго миндаля.

*Вкусъ* такой же, слегка вяжущiй.

*Употребляется* лавро-вишневая вода, какъ успокоивающее средство, особенно при грудныхъ болѣзняхъ. Снаружи ее употребляютъ при различныхъ глазныхъ болѣзняхъ.

## ВОЛЧЬЕ ЛЫКО, ВОЛЧIЙ ПЕРЕЦЪ.

Отечество Европа, Сѣверная Азiя; доставляетъ кору, которая содержитъ острую смолу, дафнинъ, эѳирное масло,

желтое красящее вещество, камедь, соли. Кора похожа на ленту; кожица тонка, бураго, сѣраго цвѣта; внутреннее вещество желтовато-зеленое.

*Запаху* не имѣетъ.

*Вкусъ* очень жгучій, острый.

*Употребляется*, какъ острое нарывное средство, которое легко производитъ нарывы, а также воспаленія въ частяхъ, къ которымъ прикасается.

## ВОНЮЧКА.

Отечество Харазанъ въ Персіи; доставляетъ такъ называемую *ассафетиду, которая содержитъ смолу, эѳирное* масло, камедь, экстрактивное вещество, растительную слизь, соли, желѣзную окись.—Ассафетида есть сокъ, вытекающій изъ косыхъ надрѣзовъ дерева и твердѣющій на воздухѣ.

*Запахъ* отвратительный, чесночный, весьма сильный.

*Вкусъ* горьковатый, противный.

*Дѣйствуетъ* на нервную систему, преимущественно на маточную, и употребляется противъ истерики, ипохондріи, глистовъ, удушья, и т. п.

## ВѢТРЕНИЦА, АНЕМОНЪ.

Многолѣтнее растеніе на безплодныхъ поляхъ Россіи и Сибири.

*Запаху* свѣжая трава почти не имѣетъ.

*Вкусъ* острый. Сухая трава имѣетъ сперва вкусъ травяный, потомъ острый.

*Употребляется*, какъ средство возбуждающее, укрѣпляющее.

## ВЯЗОВНИКЪ, ЧЕРНОБЫЛЪ.

Средство теперь почти совсѣмъ оставленное; прежде изъ него добывался такъ называемый Roob Ebuli.

## ГАЛЬБАНЪ.

Отечество Африка, Аравія, Сирія; доставляетъ гальбанъ, содержащій смолу, эѳирное масло, камедь, горькое вещество, растительную слизь. Различаютъ три сорта гальбана: въ зернахъ, *кускахъ и персидскій; послѣдній считается лучшимъ*. Онъ имѣетъ видъ кусковъ неправильной формы, очень мягкихъ и вязкихъ, сплывающихся въ одну массу; цвѣтъ красновато или блѣдно-желтый. При растираніи съ водой гальбанъ образуетъ эмульсію; въ спиртѣ растворяется хорошо, но несовершенно.

*Запахъ* непріятный, проницательный.

*Вкусъ* смолистый и горькій.

*Дѣйствуетъ*, какъ возбуждающее, кровегонное и противоспазматическое средство и потому употребляется при истерикѣ, меностазіи, ревматизмѣ.

## ГВОЗДИКА.

Отечество Молуккскіе острова, но воздѣлывается теперь на многихъ островахъ Вестъ и Остъ-Индіи; доставляетъ гвоздику, которая есть ничто иное, какъ нераспустившіяся цвѣточныя почки; онѣ содержатъ эѳирное масло, каріофиллинъ, камедь, дубильную кислоту. Цвѣтъ темный, краснобурый.

*Запахъ* ароматный, сильный, гвоздичный.

*Вкусъ* ароматный, жгучій, горьковато-пряный, острый.

*Употребляется*, какъ средство желудочное, и какъ горячащая и подкрѣпляющая пряность.

## ГИРЧА, ПУСТЫРНИКЪ.

Отечество Европа, Сѣверная Азія; доставляетъ пустырниковое сѣмя, которое содержитъ эѳирное масло, церинъ, смолу, камедь, экстрактивное вещество.

*Дѣйствуетъ* наркотически, а также гонитъ мочу; употребляется особенно при грудныхъ болѣзняхъ и противъ перемежающейся лихорадки.

## ГЛИСТНИКЪ.

Это родъ мха, содержащій хлористый натръ, сѣрнокислую известь, желѣзо, магнезію, кремнеземъ, іодистый натръ, и т. д.

*Вкусъ* и *запахъ* непріятные.

*Употребляется*, какъ средство противъ глистовъ.

## ГОРЕЧАВКА.

Растетъ на возвышенныхъ луговинахъ, каменистыхъ мѣстахъ, преимущественно на Швейцарскихъ Альпахъ и въ Южной Германіи, даетъ корень, содержащій генціанинъ,



желтое красящее вещество, зеленое жирное масло, гликозу, камедь. Въ продажѣ встрѣчаются цѣльные и ращепленные корни, негладкіе, морщиноватые, колѣнчатые; цвѣтъ ихъ снаружи сѣровато или красновато-бурый, а внутри темно-желтый.

*Вкусъ* сильно-горькій.

*Запахъ* слабый ароматный.

Составляетъ наше лучшее горькое средство, употребляемое во всѣхъ случаяхъ, гдѣ показуется чисто-горькое средство.

## ГОРЧИЦА ЧЕРНАЯ.

Отечество вся Европа, доставляетъ сѣмена черной горчицы, которыя содержатъ острое эѳирное масло, жирное масло, бѣлковину, много слизи, синапинъ, сѣру, азотъ, смолу. Сѣмена круглыя, буровато-темныя снаружи, внутри желтыя.

*Запахъ* очень слабый, который однакожъ становится сильнѣе при толченіи.

*Вкусъ* острый жгучій.

*Дѣйствуетъ*, какъ возбуждающее, и рѣдко употребляется внутрь; снаружи прикладывается въ видѣ горчичниковъ; употребляется преимущественно при нервныхъ лихорадкахъ, судорогахъ, удушьѣ, приливахъ крови къ головѣ, и проч.

## БѢЛАЯ ГОРЧИЦА.

Отечество Южная Европа; доставляетъ сѣмена бѣлой гор-



чицы, называемой также желтою или англійскою; она содержитъ синапинъ, жирное масло, и т. д. Сѣмена шарообразны, бѣловато-желтыя.

*Запаху* не имѣетъ.

*Вкусъ* острый жгучій.

*Дѣйствуетъ*, какъ средство возбуждающее, укрѣпляющее, желудокъ, слабящее. Снаружи употребляется гораздо чаще, въ видѣ горчичниковъ, и составляетъ домашнее средство.

## ГРАВИЛАТЪ, ЧИСТЕЦЪ.

Отечество Европа, Сѣверная Азія; растеніе многолѣтнее, растущее подлѣ тыновъ и въ тѣнистыхъ мѣстахъ. Доставляетъ такъ называемый гвоздичный корень, содержащій эѳирное масло, смолу, танинъ, экстрактивное вещество, чернильно-орѣшковую кислоту, слѣды сѣры. Корень мочковатый веретено-образный, цвѣта бураго.

*Запахъ* слабый, напоминающій гвоздику; сухой корень безъ запаха.

*Вкусъ* горьковато-вяжущій.

*Дѣйствуетъ*, какъ средство возбуждающее, стягивающее, весьма полезное при поносахъ, тифѣ, а также противъ перемежающейся лихорадки.

## ГРАНАТНОЕ ДЕРЕВО.

Отечество Сѣверная Африка, Азія, Южная Европа; доставляетъ гранатную корку, которая содержитъ танинъ и горь-

кое начало, смолу, слизь и чернильно-орѣшковую кислоту. Свѣжая кора составляетъ прекрасное средство противъ глистъ. Сухая употребляется рѣже.

## ГРѢЦКІЕ ОРѢХИ.

Отечество Персія и Остъ-Индія, но воздѣлывается также въ Южной Европѣ; доставляетъ зеленую орѣховую скорлупу и орѣховые листья; содержатъ дубильную кислоту, острое горькое экстрактивное начало, хлорофилъ, амиль, гликозу, яблочную кислоту, известковыя соли; въ большихъ пріемахъ поражаютъ кишечный каналъ.

*Употребляются* противъ глистъ, подагры. Орѣховые листья хорошо дѣйствуютъ при золотухѣ.

## ГУБКА БЕРЕЗОВАЯ.

Растетъ по всей Европѣ на березовыхъ стволахъ и содержитъ измѣненный фунгинъ, экстрактивное начало, соли.

*Употребляется* снаружи для останавливанья крови.

## ДЕВЯСИЛЪ.

Отечество Европа, растеніе двулѣтнее; доставляетъ девясильный корень, который содержитъ мыльное начало, особенный крахмалъ, называемый инулинъ, экстрактивное начало, соли, кали и извести.

*Запахъ* сухаго корня фіялковый.

*Вкусъ* пряный, острый.

*Дѣйствуетъ*, какъ тоническое возбуждающее средство, употребляемое особенно при катаррахъ и слизетеченіяхъ, а также противъ меркуріальнаго худосочія.

## ДЕРЯБКА.

Отечество Южная Европа; доставляетъ выжатый изъ незрѣлыхъ плодовъ сокъ, который содержитъ элатеринъ, горькое и экстрактивное начало, смолу, бѣлковину.

*Дѣйствуетъ*, какъ сильное разъѣдающее средство, и употребляется еще какъ драстическое и мочегонное, особенно въ Англіи.

## ДРОКЪ.

Отечество Европа; доставляетъ траву, которая прежде употреблялась противъ водобоязни; сѣмена, считавшіяся мочегоннымъ средствомъ, и корень, который въ сухомъ состояніи не имѣетъ никакого *запаху*.

*Вкусъ* остро горькій.

Стебель дрока вѣтвистый, листья яйцевидные, гладкіе, цвѣты желтые; запахъ у свѣжаго дрока медовый.

## ДОННИКЪ.

Отечество почти вся Европа; доставляетъ верхушки донника, содержащія эѳирное масло, росно-ладонную кислоту, особенное вещество мелилотинъ.

*Употребляется* только снаружи для размягчающихъ, разбивающихъ припарокъ, и для мелилотнаго пластыря.

## ДУБЪ.

Отечество Европа; доставляетъ кору и желуди дубовые. Кора содержитъ taнинъ, чернильно-орѣшковую кислоту, экстрактивное начало, немного сахару, воску, мягкой смолы, и т. д. Желуди содержатъ много крахмала, танинъ, горькое экстрактивное начало, жирное масло и соли.

Кора составляетъ сильное стягивающее средство, употребляемое преимущественно снаружи. Поджаренные желуди дѣйствуютъ, какъ тоническое, питательное средство, и употребляются преимущественно при золотухѣ.

## ДУБЪ ЧЕРНИЛЬНО-ОРѢШКОВЫЙ.

Отечество Малая Азія, Сирія и Месопотамія; доставляетъ чернильные орѣшки, которые есть ничто иное, какъ болѣзненные наросты на листьяхъ и стебляхъ, происшедшіе вслѣдствіе укола насѣкомымъ орѣхотворкой; форма этихъ наростовъ круглая, они тверды, величиною съ вишню, желтовато-сѣраго цвѣта, остроконечные, съ дырочками и заключаютъ яйца и личинки сказаннаго насѣкомаго. Они содержатъ дубильную кислоту, чернильно-орѣшковую кислоту, экстрактивное начало, слизь, известковыя соли.

*Дѣйствуютъ*, какъ превосходное стягивающее средство, и употребляются главнымъ образомъ противъ отравленія ал-

калоидами, особенно стрихниномъ и бруциномъ, а также противъ отравленія ипекакуаной и рвотнымъ камнемъ.

## Дурманъ.

Отечество сперва Остъ-Индія, теперь растетъ въ Европѣ; даетъ траву и сѣмена, содержащія датуринъ, экстрактивное вещество, жирное масло, смолу, бѣлковину, соли. Стебель прямой, толстый, гладкій, отъ двухъ до четырехъ фут. длины, двураздѣльно вѣтвистый; листья яйцеобразные, выемчато-зубчатые, гладкіе, сверху темно-зеленые, снизу блѣдно-зеленые, цвѣты бѣлые, иногда фіолетово-синіе. Сѣмена почко-образныя, немного сжатыя, снаружи морщинистые, цвѣта темно-бураго; внутреннее вещество ихъ бѣловатое.

*Запахъ* травы противный, одуряющій.

*Вкусъ* непріятный, острый, горько-солоноватый, производящій тошноту.

*Дѣйствуетъ* сильнѣе сонной одури; составляя не совсѣмъ вѣрное средство, рѣдко употребляется и требуетъ осторожности.

## Душица.

Отечество Южная Европа, Южная Америка; растеніе многолѣтнее; доставляетъ траву и верхушки, содержащія ѳирное масло, танинъ. Стебель прямой, листья яйцевидные, зеленые; цвѣты фіолетовые.

*Запахъ* пріятный, ароматный.

*Вкусъ* слегка вяжущій, горько-пряный.

*Употребляется* для ароматическихъ ваннъ.

## ДЫМЯНКА.

Отечество вся Европа; доставляетъ траву, которая содержитъ фумариновую кислоту, протеиновое вещество, слизь, соли. Стебель вѣтвистый, листья поперемѣнные, сѣро-зеленые, цвѣты пурпуровые, сидятъ кистями.

*Запаху* не имѣетъ.

*Вкусъ* свѣжей травы горькій, слегка солоноватый.

*Употребляется*, какъ легкое тоническое, растворяющее средство, особенно при долговременныхъ накожныхъ сыпяхъ.

## ДЯГИЛЬ ВОНЮЧІЙ.

Отечество средняя Европа; доставляетъ корень, содержащій эѳирное масло, горькое вещество, экстрактивное вещество, ангеликовую кислоту, воскъ, дубильное начало, и т. д. Корень снаружи бураго, внутри бѣловатаго цвѣта, веретенообразенъ, вѣтвистъ.

*Запахъ* сильный, бальзамическій, пріятный.

*Вкусъ* сперва сладковатый, а потомъ жгучій, пріятный.

*Дѣйствуетъ*, какъ средство возбуждающее, укрѣпляющее и потогонное. Употребляется противъ вялости пищеварительныхъ органовъ, а также въ тифѣ и при легочномъ катаррѣ.

## ЕЖЕВИКА.

Растетъ по всей Европѣ, доставляетъ ягоды, употребляемыя для ежевичнаго сиропа.

## ЕЛЬ.

Ель бальзамическая и канадская; доставляетъ канадскій терпентинъ, который дѣйствуетъ раздражающимъ образомъ и въ большихъ дозахъ производитъ рвоту, воспаленіе желудка и т. д. Снаружи часто употребляется для пластырей, мазей, и т. п. Терпентинное масло употребляется противъ глистъ, желчевыхъ камней, спазмъ, водянки.

## ЖАБРЕЙ.

Отечество вся Европа; доставляетъ траву, содержащую горькое экстрактивное вещество, смолу, камедь, сахаръ и т. д. Весьма полезенъ при катаррахъ.

## ЖАТЕРЪ.

Отечество вся Европа; доставляетъ ягоды, изъ которыхъ прежде изготовляли дѣтскіе слабительные сиропы; онѣ содержатъ катартинъ, слизь, сахаръ, слабящее экстрактивное вещество, бѣлковину, смолу, и т. д.

## ЖЕЛТНИКЪ ЯДОВИТЫЙ, СУМАХЪ.

Отечество Виргинія, Каролина, Канада; доставляетъ листья, содержащіе летучее, очень острое начало, уксусную и дубильную кислоты, смолы, камедь. Листья тройные на длинныхъ стебелькахъ, яйцевидные, заостренные, сверху гладкіе, снизу пушистые, блѣдно-зеленые.

*Запаху* не имѣютъ.

*Вкусъ* вяжущій.

*Дѣйствіе* сильное наркотическое, употребляется при ломотѣ и ревматическихъ боляхъ въ суставахъ.

## ЖОФРЕЯ.

Форма коры—плоскіе или желобоватые куски, желто-сѣрые или зеленовато-бурые.

*Запахъ* слабый.

*Вкусъ* очень горькій.

## ЗАВЯЗНИКЪ, УЗИКЪ.

Многолѣтнее растеніе, встрѣчающееся по лѣсамъ и песчанымъ мѣстамъ Европы, сѣверной Азіи; доставляетъ корень, который содержитъ дубильную кислоту, красящее начало, экстрактивное вещество, слѣды эѳирнаго масла. Корень цилиндрическій, снаружи темно-бурый, внутри красно-бурый.

*Запаху* не имѣетъ.

*Вкусъ* вяжущій.

*Дѣйствуетъ*, какъ чисто стягивающее средство.

## ЗАРЯ, ЛЮБИСТОКЪ.

Отечество вся Европа; доставляетъ корень, который содержитъ эѳирное масло, смолу, экстрактивное вещество, бальзамъ, бассоринъ, камедь, крахмалъ, растительную дубильную кислоту, соли. Корень вѣтвистъ, веретено-образенъ, снаружи коричневый, внутри желтоватый; сухой корень имѣетъ снаружи буро-сѣрый, а внутри сѣро-желтый цвѣтъ.

*Запахъ* сильный, ароматный.

*Вкусъ* пряный, слегка сладковатый.

*Дѣйствуетъ* преимущественно какъ мочегонное средство и употребляется при водяной болѣзни.

## ЗАЯЧЬЯ КРОВЬ, ЖУРАВЕЦЪ.

Отечество сѣверная Африка, Азія, вся Европа; доставляетъ траву, которая содержитъ красное красящее вещество, эѳирное масло, таниңъ, желтое красящее вещество, камедь. Теперь рѣдко употребляется.

## ЗМѢЕВИКЪ.

Многолѣтнее растеніе, встрѣчающееся въ умѣренной Рос-



сіи; доставляетъ корень, содержащій много дубильной кислоты, амиля и чернильно-орѣшковой кислоты.—Корень кривой и загнутый, кольчатый, съ волоконцами; цвѣтъ снаружи темно-бурый, а внутри красно-бурый.

*Запаху* не имѣетъ.

*Вкусъ* сильно-вяжущій.

*Дѣйствуетъ*, какъ стягивающее средство.

## ЗОЛОТОТЫСЯЧНИКЪ.



Однолѣтнее растеніе, распространенное по всей Европѣ; доставляетъ траву золототысячняка, которая содержитъ горькія экстрактивныя вещества, слизь, свободныя кислоты, соли. — Стебль вышиною около фута, четырехъгранный, вѣтвистый; листья противоположные, сидячіе, овально продолговатые; цвѣты розовые, сидящіе пучками.

*Запаха* нѣтъ.

*Вкусъ* очень горькій.

*Дѣйствуетъ*, какъ горько-тоническое средство, которое употребляется преимущественно противъ легкихъ перемежающихся лихорадокъ.

## ИБУНКА.

Распространена по всей Европѣ; даетъ траву, средство противо-цинготное, употребляемое преимущественно въ видѣ свѣже-выжатаго сока.

## ИВА.

Растетъ во всей Европѣ; доставляетъ кору, которая содержитъ кристаллическую горькую субстанцію (салицинъ), дубильную кислоту, красно-коричневое смолистое вещество, желтое красящее вещество, камедь. Дѣйствуетъ, какъ тоническое и слабостягивающее средство, прежде же употреблялась, какъ суррогатъ хины. Салицинъ хорошъ противъ перемежающейся лихорадки. Въ видѣ ваннъ, ивовая корка оказалась полезною для слабыхъ дѣтей.

## ИГЛА ПРИДОРОЖНАЯ, КРУШИНА.

Отечество вся Европа; доставляетъ ягоды шарообразныя, чернаго цвѣта, величиною съ горошину.

*Вкусъ*, слабый, непріятный, слегка сладковатый вначалѣ, а потомъ противный и горькій.

*Запахъ* слабый, непріятный.

*Употребляется,* какъ легкое слабительное.

## ИЛИМЪ.

Растетъ по всей Европѣ; доставляетъ внутреннюю кору илима, содержащую много камеди и слизи, а также смолу, дубильное вещество и экстрактивное, соли, и т. д.; цвѣтъ желто-бурый.

*Запаху* не имѣетъ.

*Вкусъ* горько-вяжущій.

*Дѣйствуетъ,* какъ чисто стягивающее средство.

## ИНБИРЪ.

Отечество Остъ-Индія, Мадагаскаръ, Цейлонъ; доставляетъ инбирный корень, пряный и острый. Обыкновенно употребляются высушенные корни, длиною отъ полутора до трехъ дюймовъ; цвѣтъ снаружи бѣло-зеленоватый, внутри красно-бѣлый.

*Запахъ* сильный, пріятный.

*Вкусъ* очень острый.

*Употребляется* при слабости пищеварительныхъ органовъ.

## ИНБИРЪ ДЛИННЫЙ, КУРКУМА.

Отечество Остъ-Индія; доставляетъ корень куркумы, мало употребительный, богатый желтымъ красящимъ веществомъ.

Корень имѣетъ различныя очертанія, вообще же бываютъ цилиндрическій, длиною отъ 2 до 3 дюймовъ; куски немного искривлены, кольчаты, плотны, тяжелы; цвѣтъ внутри ярко-желтый.

*Запахъ* напоминаетъ инбирь.

*Вкусъ* горько-пряный.

## ИНДИГОВОЕ РАСТЕНІЕ.

Отечество Остъ-Индія; воздѣлывается также въ Мехикѣ и Вестъ-Индіи; доставляетъ индиго и считается полезнымъ средствомъ противъ неврозъ и эпилепсіи; пріемы начинаются малыми дозами.

## ИПЕКАКУАНА.

Отечество первобытные лѣса Бразиліи; доставляетъ ипекакуану, рвотный корень, который содержитъ эметинъ, воскъ, жирное масло, камедь, бѣлковыя вещества и древесныя волокна. Корень имѣетъ видъ искривленныхъ кусковъ, длиною отъ 1 до 6 линій, толщиною 2 линіи, цвѣтъ снаружи буроватый; корень ломокъ, упругъ, въ изломѣ ровенъ. Пыль корня, попадая въ носъ, производитъ чиханіе. По цвѣту различаютъ три рода ипекакуаны, бурый, сѣро-красный и сѣро-бѣлый.

*Запаху* почти не имѣетъ; онъ замѣтенъ только при толченіи, но въ весьма незначительной степени.

*Дѣйствуетъ* въ небольшихъ количествахъ (отъ четверти до половины золот.), какъ средство тоническое, противосудо-

рожное, и употребляется преимущественно противъ пораженія слизистой оболочки дыхательныхъ органовъ и кишечнаго канала, при поносахъ и кровотеченіяхъ. Въ большихъ количествахъ ипекакуана дѣйствуетъ, какъ рвотное. Въ послѣднемъ случаѣ весьма хорошо употреблять ее малыми пріемами, чтобы каждый новый пріемъ слѣдовалъ за предъидущимъ тогда только, кагда нѣтъ еще рвоты.

## ИРЪ, АИРЪ, КАСАТИКЪ.

Отечество Европа, Азія, Сѣверная Америка; доставляетъ ирный корень, который содержитъ эѳирное масло, камедь, инулино-образный крахмалъ, горькую смолу, экстрактивное вещество, соли, сѣру. Корень цилиндрическій, колѣнчатый, со множествомъ мочекъ. Цвѣтъ снаружи зеленовато-красноватый, внутри бѣлый.

*Запахъ* ароматный, пріятный.

*Вкусъ* горько-пряный.

*Дѣйствуетъ*, какъ хорошее ароматическое средство, особенно полезное при испорченномъ пищевареніи, хлорозисѣ, перемежающейся лихорадкѣ, цингѣ, и т. п.

## ИСЛАНДСКІЙ МОХЪ.

Отечество Сѣверная Европа, Сѣверная Америка; доставляетъ исландскій мохъ, содержащій особенный крахмалъ, центраринъ, камедь, некристаллизующійся сахаръ, и т. д.; употребляется при хроническихъ катаррахъ и легочной чахоткѣ.

## ИССОПЪ.

Отечество Южная Европа; доставляетъ иссопную траву, содержащую иссопинъ, эѳирное масло, смолу, немного жирнаго масла, танинъ, и т. д. Стебель прямой, четырехъ-гранный, листья противоположные, ланцетовидные, зеленые; цвѣты темно-голубые, иногда красные или бѣлые.

*Запахъ* ароматный, пріятный.

*Вкусъ* горько-пряный.

*Дѣйствуетъ*, какъ легкое возбуждающее, тоническое, и часто употребляется при хроническихъ болѣзняхъ легкихъ, снаружи какъ слегка стягивающее.

## ИСТОДЪ.

Отечество Европа; доставляетъ траву и корень истода, содержащіе горькое кристаллическое вещество, бѣлокъ, эѳирное масло, хлорофилъ, сахаръ. Корень съ тонкими желтоватыми мочками; листья, расположенные кресто-образно; цвѣтки синеватые.

*Запаху* не имѣетъ.

*Вкусъ* сильно-горькій.

## КАКАО.

Отечество Мехика, Южная Америка; доставляетъ бобы какао, содержащіе твердое жирное масло, бѣлокъ, камедь,

красящее вещество и такъ называемый теоброминъ. Бобы яйце-образные, плоскіе, твердые, буро-коричневые.

*Запаху* нѣтъ.

*Вкусъ* пріятный, слегка горьковатый.

Какаовое масло употребляется на мази для глазъ, губъ и груди.

## КАЛАЧИКИ, ПРОСВИНЯКЪ.



Отечество вся Европа; доставляетъ цвѣты и траву калачиковъ; содержитъ слизь, экстрактивное вещество, а цвѣты еще фіолетовый пигментъ.

Листья сердце-образные, усѣянные мягкими волосками. Цвѣтки блѣдно-розовые.

*Запаху* нѣтъ.

*Вкусъ* слизистый.

*Качество* мягчащее.

## КАЛГАНЪ.

Отечество Индѣйскій архипелагъ, Яла, Суматра, и проч.; доставляетъ калганный корень. Послѣдній имѣетъ цилиндрическую форму, длиною отъ 3 до 4 дюймовъ, шишковатъ, толщиною отъ половины до 1 дюйма, покрытъ тонкими бо-

роздками; цвѣтъ снаружи буро-красный, внутри свѣтло-красный.

*Запахъ* ароматный.

*Вкусъ* остро-жгучій, горьковатый.

*Употребляется* отъ желудочныхъ болей.

## КАМПЕШЕВОЕ ДЕРЕВО.

Отечество Мехика; доставляетъ кампешевое дерево, содержащее гематоксименъ, танинъ, клейкообразную матерію, соли. Стволъ имѣетъ видя тяжелыхъ, толстыхъ, большихъ кусковъ, цвѣта темно-краснаго или красно-чернаго.

*Запахъ* фіялковый.

*Вкусъ* сладковато-вяжущій.

*Дѣйствіе* укрѣпляющее; медленно стягивающее; полезно въ хроническомъ поносѣ и вялости кишечнаго канала.

## КАМФОРНЫЙ ЛАВРЪ.

Отечество Китай, Японія; доставляетъ камфору, которую можно разсматривать какъ твердое эѳирное масло, добываемое изъ различныхъ частей растенія посредствомъ варки и дестилляціи. Имѣетъ видъ твердый, бѣлой, прозрачной массы, зернистаго строенія.

*Запахъ* сильный, особенный, камфорный.

*Вкусъ* пряный, горьковатый.

*Дѣйствуетъ* преимущественно на сосудистую и нервную систему, какъ средство успокоивающее; производитъ прекра-

щеніе половыхъ побужденій, а также потъ; въ большихъ дозахъ дѣйствуетъ, какъ сильный ядъ, какъ острое наркотическое вещество. Часто употребляютъ ее въ тифѣ, какъ возбуждающее средство. Камфора оказалась весьма полезною при различныхъ болѣзняхъ половыхъ органовъ и при невральгіи.

## КАПУЦИНЫ, НАСТУРЦІЯ.

Отечество Европа; доставляетъ траву, менѣе дѣйствительную чѣмъ ложечная трава; содержитъ іодъ.

## КАРДАМОНЪ.

Отечество Малабаръ, Мадагаскаръ; доставляетъ кардамонное сѣмя, особенно богатое эѳирнымъ масломъ. Сѣмена угловаты, морщинисты, цвѣтъ снаружи бурый, внутри бѣловатый.

*Запахъ* ароматный.

*Вкусъ* горько-пряный.

*Употребляется* противъ вѣтровъ, пученья.

## КАРДОБЕНЕДИКТЫ, КРЕСТОВЫЙ КОРЕНЬ

Отечество Южная Европа; доставляетъ траву, которая содержитъ горькое экстрактивное начало, зеленую мягкую смолу, слизь, эѳирное масло, много кислаго кали, селитры. Стебель прямый вѣтвистый, липкій; листья зазубрены, покрыты липкимъ бѣлымъ пухомъ; цвѣты желтые.

*Запахъ* непріятный.

*Вкусъ* сильно-горькій.

*Дѣйствуетъ* какъ горькое тоническое, укрѣпляющее желудокъ и слегка мочегонное; употребляется преимущественно при испорченномъ пищевареніи.

## КАРРАГЕНСКІЙ МОХЪ.

Иначе Ирландскій мохъ, содержитъ особенное вещество, слизь, смолу, соли и слѣды іода и брома. Употребляется, какъ питательное средство, при бугорчатой чахоткѣ, поносѣ.

## КАСКАРИЛЛА.

Отечество Перу, Ямайка, Флорида; доставляетъ каскарилловую кору, которая содержитъ эѳирное масло, смолу, горькое начало, слизь, кали и известковыя соли. Кора имѣетъ видъ трубчатыхъ, желобоватыхъ кусковъ; покрыта бѣловатою кожицею; внутри бураго цвѣта.

*Запахъ* напоминаетъ мускусъ, особенно при сожиганіи.

*Вкусъ* пріятный, горькій.

*Употребляется*, какъ возбуждающее и тоническое средство, преимущественно при вялости пищеварительныхъ органовъ.

## КАССІЯ.

Лавръ—кассія доставляетъ худшій сортъ корицы.

## КАТЕХУ.

Отечество Остъ-Индія, особенно Бенгалъ и Коромандель; доставляетъ катеху, которая содержитъ taнинъ, экстрактивное вещество, слизь, кислоту катеху.

*Употребляется*, какъ стягивающее средство.

## КАШКАРА. САБИНА.

Отечество Сѣверная Азія, Восточная Сибирь; доставляетъ листья, содержащіе экстрактивное вещество, зеленый растительный воскъ, танинъ, слѣды эѳирнаго масла. Листья продолговаты, съ краевъ свернуты, гладки, сверху зеленые, а снизу ржаваго цвѣта.

*Запахъ* непріятный, напоминающій ревень.

*Вкусъ* горькій.

*Употребляется*, какъ мочегонное и потогонное средство, при подагрѣ и ревматизмѣ.

## КАШТАНЪ КОНСКІЙ.

Отечество сперва сѣверная часть Персіи, теперь же Европа; доставляетъ кору конскаго каштана, которая содержитъ дубильную кислоту, горькое экстрактивное вещество, красный пигментъ, зеленое жирное масло, свободныя кислоты, камедь. Кора имѣетъ видъ трубчатый или желобоватый, съ сѣропепельною кожею. Корковый слой зеленовато-бурый, лубъ желтоватый.

*Запаху* нѣтъ.

*Вкусъ* вяжущій, горькій.

*Дѣйствуетъ*, какъ стягивающее тоническое средство.

## КАЯПУТОВОЕ ДЕРЕВО.

Отечество Остъ-Индія, Малабаръ, Целебесъ и Борнео; доставляетъ каяпутовое масло, которое содержитъ не совсѣмъ жидкое, безцвѣтное, почти нелетучее масло.

*Запахъ* сильный, напоминающій терпентинъ и камфору.

*Вкусъ* острый.

*Дѣйствуетъ*, какъ средство возбуждающее, подобно камфорѣ и балдріану, и употребляется какъ противоспазматическое при неврозахъ, кардіальгіи, удушьѣ и параличѣ. Снаружи противъ зубной и ушной болей.

## КВАССІЯ.

Отечество Суринамъ, Ямайка; доставляетъ кору и дерево квассіи; содержитъ квассинъ, камедь, экстрактивное вещество, эѳирное масло и соли. Форма ствола цилиндрическая, прямая, съ сучками; кожа тонка, ломка, легко отстаетъ; вещество ствола волокнисто, бѣлаго цвѣта.

*Запаху* нѣтъ.

*Вкусъ* чисто-горькій, сильный.

*Употребляется*, какъ горькое средство и особенно въ атонической подагрѣ.

## КИСЛЕЦЪ.

Отечество Европа; растеніе богато кали и щавелевою кислотой, доставляетъ кисличную соль.

## КИШНЕЦЪ.

Отечество Южная Европа, Востокъ; доставляетъ кишнецевое сѣмя, содержащее эѳирное масло, стеаринъ, олеинъ, экстрактивное вещество, протеиновую слизь.

*Употребляется*, какъ средство, помогающее пищеваренію.

## КЛЕЩЕВИНА.

Отечество Остъ и Вестъ-Индія, Сѣверная Африка, но ростетъ и въ Европѣ; доставляетъ клещевинныя сѣмена, изъ которыхъ добывается рициновое, клещевинное масло, содержащее олеинъ и стеаринъ и употребляемое какъ слабительное.

## КОЛОМБА.

Отечество Восточная Африка; доставляетъ корень коломбы, содержащій желтое горькое вещество (колумбинъ), экстрактивное начало, воскъ, камедь, крахмалъ.

*Дѣйствуетъ*, какъ тоническое средство, и употребляется при хроническомъ поносѣ, спазматической рвотѣ.

## КОЛОЦИНТЫ.

Отечество Сирія, Греція, Южная Африка; доставляетъ плоды, содержащіе горькое начало, смолу, экстрактивное вещество, камедь, чернильно-орѣшковую кислоту, желто-зеленое жирное масло, и т. д. Они сильно слабятъ, въ большихъ пріемахъ могутъ произвесть колику.

*Запахъ* отвратительный.

*Вкусъ* сильно-горькій, острый, непріятный.

*Употребляется*, какъ драстическое и кровегонное средство.

## КОНОПЛЯ.

Отечество Остъ-Индія, воздѣлывается у насъ; доставляетъ конопляное сѣмя, которое содержитъ эѳирное масло, смолу, гликозу, экстрактивное начало, бѣлокъ.

*Дѣйствуетъ*, какъ болеутоляющее, смягчающее средство, и употребляется особенно при болѣзняхъ мочевыхъ органовъ.

## КОНТРАЕРВА.

Отечество Южная Америка; доставляетъ корень контраервы, дѣйствующій подобно корню виргинскаго змѣевика, составляя возбуждающее, потогонное средство.

## КОПАЙ.

Отечество Бразилія; доставляетъ копайскій бальзамъ, сокъ, вытекающій изъ наколовъ; содержитъ эѳирное масло, желтую

кристаллизующуюся смолу, темную смолу, жирныя вещества. Цвѣтъ бальзама блѣдно-желтый, густота такая, какъ жирнаго масла.

*Запахъ*, особенный, ему свойственный.

*Вкусъ* особенный, непріятный, островато горьковатый.

*Дѣйствуетъ* преимущественно на кожу и слизистую оболочку мочевыхъ и половыхъ органовъ, легкихъ и дыхательныхъ путей, почему употребляется при застарѣлыхъ катаррахъ, слизетеченіяхъ, особенно при трипперѣ.

## КОПЫТНИКЪ, ПОДОРѢШНИКЪ.

Отечество Средняя и Сѣверная Европа; доставляетъ корень копытника, содержащій азаринъ, летучее масло, смолу, танинъ. Корень морщинистый, суставчатый, стелющійся, тонкій; цвѣтъ сѣро-бурый, внутри бѣлый. Пыль корня производитъ чиханье, если попадетъ въ носъ.

*Запахъ* ароматный, довольно сильный, похожій на запахъ валеріаны.

*Вкусъ* непріятный, острый и жгучій.

*Дѣйствуетъ*, какъ рвотное и раздражающее средство.

## КОРИЦА.

Есть два сорта корицы; одинъ получается съ Цейлона, Явы, и называется цейлонскою коричневой коркой; она содержитъ эѳирное масло (коричневое), танинъ, слизь, росно-ладанную кислоту, пигментъ, амиль. Другой сортъ называется

китайскою корицею; онъ содержитъ болѣе, чѣмъ предыдущій, эѳирнаго масла, гораздо дешевле и потому употребляется чаще. Цвѣтъ корицы темный, корка отличается толщиною и величиной.

*Запахъ* ароматный, особенный, коричневый.

*Вкусъ* горячительный.


*Употребляется*, какъ слабое укрѣпляющее желудокъ при несвареніи.

## КОФЕЙНОЕ ДЕРЕВО.

Отечество Америка, Африка; доставляетъ, кофе, содержащій каффеинъ, жирныя вещества, протеиновое вещество, твердое эѳирное масло, соли. — Различаютъ три главныхъ сорта кофе: 1) Аравійскій кофе; бобки мелкіе буроватые, овальнаго очертанія, съ одной стороны гладкіе, съ другой какъ-бы раздѣленные бороздой; сырые бобки не имѣютъ запаха, но при поджиганьи издаютъ пріятно-ароматный запахъ. 2) Остъ-Индскій кофе, крупнѣе другихъ, блѣдно-желтаго цвѣта. 3) Американскій кофе, средней величины, цвѣта зеленовато-желтаго.

*Употребляется* съ пользою противъ перемежающейся лихорадки, нервнаго удушья, извѣстныхъ болей головы, также противъ поноса у новорожденныхъ дѣтей. Извѣстно, что неумѣренное употребленіе кофе вредно дѣйствуетъ на нервную систему и производитъ безсонницу.

## КРАПИВА ЖГУЧАЯ.



Растеніе многолѣтнее, растущее вездѣ около заборовъ, въ садахъ и на поляхъ, около дорогъ, по опушкѣ лѣсовъ, по нежилымъ мѣстамъ. Цвѣтетъ все лѣто. Употребляется все растеніе, которое собираютъ до цвѣтенія; до самаго холода она сохраняетъ свои цѣлебныя свойства; ее употребляютъ въ свѣжемъ видѣ, потому что отъ плѣсени она дѣлается никуда негодною.

*Качества* ея слабящее.

## КРАПЪ, МАРЕНА.

Отечество Южная Европа, Малая Азія; доставляетъ корень марены, содержащій красное (ализаринъ) и желтое (ксантинъ) красящее вещество, смолу и нѣкоторыя соли. Прежде употреблялся противъ болѣзней костей.

## КРОТОНЪ.

Отечество Остъ-Индія, Бенгалъ; доставляетъ кротоновое масло, добываемое изъ сѣменъ посредствомъ выжиманья, или

посредствомъ алкоголя; масло довольно густо, свѣтло-желтаго цвѣта, содержитъ особенный алкалоидъ (кротонинъ) и летучую кислоту (кротоновую), смолу, камедь и слѣды эѳирнаго масла.

*Дѣйствуетъ* очень скоро, какъ сильное драстическое средство, и употребляется въ тѣхъ случаяхъ, когда нужно имѣть при малыхъ дозахъ быстрое дѣйствіе.

## КУБЕБА.

Доставляетъ перецъ кубебу, содержащій кубебинъ, эѳирное масло, смолу, камедь, экстрактивное начало; имѣетъ видъ круглыхъ ягодъ, сѣровато-бураго цвѣта.

*Запахъ* особенный, ароматный, кубебный.

*Вкусъ* горьковато-острый, пряный

*Употребляется* преимущественно противъ триппера.

## КУДРЯВЕЦЪ, МАРЪ БЛАГОВОННАЯ.

Отечество Мехика, Вестъ-Индія, у насъ разводится въ садахъ; доставляетъ траву, которая содержитъ эѳирное масло, мягкую смолу, экстрактивное вещество, бѣлокъ, камедь, хлорофилъ, слѣды сѣры. Стебель прямой, вѣтвистый, листья ланцето-образные, сверху голые, свѣтлозеленые; цвѣтки небольшіе, зеленоватые, расположенные въ видѣ колоса.

*Запахъ* ароматно-пріятный.

*Вкусъ* пряно-жгучій.

*Дѣйствуетъ* какъ средство возбуждающее и растворяющее; также содѣйствуетъ кожной, печеночной и легочной дѣятельности.

## КУКЕЛЬВАНЪ.

Отечество Малабаръ, Целебесъ; доставляетъ кукельванъ. Сѣменная кожа содержитъ два алколоида: мениспериинъ и парамениспериинъ, оба не ядовитые; пикромаксинъ или коккулинъ дѣйствуетъ, напротивъ того, какъ стрихнинъ, отчего кукельванъ очень ядовитъ и потому употребляется только снаружи.

## КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ.

Отечество Европа; доставляетъ салепный корень, содержащій отвратительное, тянущееся масло, горькое начало, крахмалъ, бассоринъ, поваренную соль. Корень имѣетъ видъ клубней различной величины; цвѣтъ ихъ бѣловато-сѣрый.

*Запаху* нѣтъ.

*Вкусъ* слизистый.

*Употребляется*, какъ средство питательное и какъ обволакивающее, слизистое, при различныхъ болѣзняхъ.

## КУЧЕЛЯБА, ЦѢЛИБУХА.

Отечество Остъ-Индія; доставляетъ рвотный орѣхъ, содержащій стрихнинъ, бруцинъ, пигментъ, бассоринъ, камедь, молочную кислоту. Сѣмена или орѣшки плоски, круглы, въ

поперечникѣ до 1 дюйма; на краяхъ иногда толще, чѣмъ въ срединѣ, гдѣ съ верхней стороны есть маленькое углубленье, а снизу возвышеніе; снаружи имѣютъ свѣтло-бурый или свѣтло-коричневый цвѣтъ и покрыты тонкими, черными волосками. Внутреннее вещество ихъ бѣлое, твердое, роговидное.

*Запаху* нѣтъ.

*Вкусъ* очень горькій, отвратительный.

Цѣлибуха и ея алколоиды принадлежатъ къ весьма ядовитымъ веществамъ, которыя нужно употреблять очень осмотрительно. Онѣ оказались полезны при ломотѣ, перемежающейся лихорадкѣ, хроническихъ поносахъ, кардіальгіи.

## ЛАВАНДА.

Отечество Южная Европа; доставляетъ цвѣты, содержащіе много эѳирнаго масла, танина и горькаго вещества. Цвѣты похожи на колосья, сидящіе на верхушкѣ ствола и вѣтвей; цвѣтъ голубой.

*Запахъ* ароматный.

*Вкусъ* горячительный, пряно-горьковатый.

*Употребляется* для припадокъ; масло идетъ для приданія запаху мазямъ, спирту, и проч.

## ЛАВРЪ.

Отечество Малая Азія, Сѣверная Африка, Южная Европа; доставляетъ лавровые листья и ягоды, содержащіе лавринъ, лавровую камфору, зеленое жирное масло, смолу, экстрак-

тивное вещество, амиль, стеаринъ, сахаръ. Лаврое масло жирно и добывается изъ свѣжихъ ягодъ въ Южной Европѣ, посредствомъ выжиманья и выварки. Ягоды продолговато-круглыя, черныя.

*Запахъ* пріятно-ароматный.

*Вкусъ* горько-пряный.

Лавровые листья и ягоды употреблялись прежде, какъ средства ароматическія, укрѣпляющія желудокъ и кровегонныя. Масло употребляется при спазмахъ, коликѣ и т. д., въ видѣ растиранья.

## ЛАДАНЪ.

Отечество Малая Азія; доставляетъ ливанъ, ладанъ, содержащій эѳирное масло, смолу, камедь, и т. д.—Росной ладанъ бываетъ двухъ сортовъ: зернами и кусками. Первый сортъ имѣетъ форму неправильную, въ видѣ плоскихъ кусковъ, цвѣта снаружи темновато-желтоватаго, внутри бѣлаго блестящаго. Другой сортъ представляетъ неправильные куски скважистаго строенія.

*Запахъ* роснаго ладана весьма пряный, напоминающій запахъ перувіанскаго бальзама.

*Вкусъ* бальзамическій, острый.

*Употребляется* для обкуриванья.

## ЛАНДЫШЪ.

Отечество Европа, Сѣверная Азія, Сѣверная Америка; доставляетъ ландышные цвѣты, содержащіе эѳирное масло, смо-

лу, горькое экстрактивное вещество. — Употребляются для такъ называемаго pulvis sternutatorius.

## ЛАКТУКЪ.

Отечество вся Европа; доставляетъ лактукаріумъ, высушенный сокъ, который добывается посредствомъ надрѣзовъ на стволѣ во время цвѣтенія; содержитъ лактуцинъ, смолу, камедь, каучукъ, и т. д.; лактукаріумъ дѣйствуетъ подобно опіуму, но не такъ сильно. Особенно полезенъ при кардіальгіи и судорожномъ камнѣ.

## ЛЕНЪ.

Отечество Востокъ, Европа; доставляетъ льняное сѣмя и масло, содержащія жирное масло, камедь, слизь, воскъ, оранжево-желтый и смолистый пигментъ, клейковину. Сѣмена яйцевидно-продолговатыя, плоскія, гладкія, блестящія, бураго цвѣта, безъ запаха; вкусъ непріятный, сладко-слизистый. Масло добываемое изъ сѣменъ, цвѣта буровато-желтаго, довольно густо; вкусъ и запахъ его довольно непріятны.

Льняное сѣмя дается внутрь, какъ средство утишающее, въ видѣ декокта, при *раздраженіи кишечнаго канала*, мочеполовыхъ органовъ, особенно при трипперѣ. Крупно истолченное, оно употребляется для припарокъ. Льняное масло прибавляется къ клистирамъ, а смѣшанное съ желткомъ или известковою водой, употребляется отъ обжоговъ.



## КУКУШКИНЪ ЛЕНЪ.

Отечество вся Европа. Прежде употреблялся, какъ слабительное и мочегонное.

## ЛИМОНЪ.

Отечество Азія, воздѣлывается также въ Африкѣ, Южной Европѣ, Вестъ-Индіи и Америкѣ; доставляетъ: а) лимонную кору, содержащую эѳирное масло, горькое экстрактивное вещество; употребляется, какъ средство, исправляющее пищеваренье; б) лимонное масло, состоящее изъ цитраниза и цитрина; в) лимонный сокъ, добываемый изъ свѣжихъ плодовъ посредствомъ выжиманья и содержащій лимонную кислоту, яблочную кислоту, сахаръ, слизь; *употребляется* преимущественно для лимонадовъ, какъ средство прохлаждающее, утоляющее жажду.

## ЛИПА.



*Отечество Европа;* доставляетъ липовый цвѣтъ, который собираютъ въ іюлѣ. Собранные цвѣтки отдѣляютъ отъ прицвѣтника и сушатъ на бумагѣ въ тѣни, чтобы сохранить ихъ ароматъ, потомъ ссыпаютъ въ банки и закупориваютъ.

*Употребляются* внутрь, какъ потогонное, въ видѣ чая, и снаружи въ видѣ ваннъ.

## ЛИСТВЕННИЦА.

Доставляетъ венеціанскій терпентинъ.

## ЛИХАРАДОЧНАЯ ТРАВА.

Отечество Германія, Испанія, Франція; доставляетъ траву. Стебель суставчатый, прямой, вышиной полтора фута, вверху четырехъ-гранный, голый, сочный; листья сидячіе, ланцетовидные; цвѣтки бѣлые или красноватые.

*Запаху* нѣтъ.

*Вкусъ* остро-горькій.

*Дѣйствуетъ* сильно на нервную систему и можетъ умертвить вслѣдствіе сильнаго раздраженія слизистой оболочки кишечнаго канала, въ небольшихъ пріемахъ дѣйствуетъ какъ слабительное, которое съ пользою употребляется при помѣшательствѣ, маніи, меланхоліи, водобоязни, подагрѣ, сифилисѣ и хроническихъ накожныхъ сыпяхъ.

## ЛОБЕЛІЯ ОДУТЛАЯ.

Отечество Виргинія, Канада; доставляетъ листья, богатые лобелиномъ, дѣятельнымъ началомъ растенія, раздражающею почти жидкою массой. Стебель величиною около фута, вѣтвистъ, въ нижней части пушистый; листья зазубренные, продолговато-овальные.

*Запахъ* похожъ на табачный.

*Вкусъ* отвратительный, раздражающій, остро-горькій.

Легко производитъ рвоту и употребляется преимущественно при удушьѣ, въ видѣ тинктуры, по 10 капель чрезъ каждые полчаса.

## ЛОЖЕЧНАЯ ТРАВА.

Отечество Сѣверная Европа, Англія, Исландія, Гренландія; доставляетъ траву, которая содержитъ острое, весьма летучее, богатое сѣрою масло, зеленый крахмалъ, бѣлокъ, горькую смолу. Стебель прямой, вѣтвистый, листья сердце-видные, зубчатые, у корня стебельчатые; цвѣтъ бѣлый.

*Запахъ* свѣжаго растенія напоминаетъ рѣдечный, острый, жгучій.

*Вкусъ* горьковато-соленый.

Сухое растеніе не имѣетъ ни запаха, ни вкуса.

*Употребляется* преимущественно противъ цинги; свѣжую траву даютъ одну или вмѣстѣ съ настурціей и другими травами.

## ЛОМОНОСЪ.

Отечество Южная Европа; доставляетъ траву ломоноса, которая составляетъ сильное разъѣдающее средство, раздражающее преимущественно кожу.

*Дѣйствуетъ*, какъ мочегонное, потогонное и слабительное средство, но при употребленіи его надобно быть осторожнымъ.

## ЛОПУШНИКЪ, РЕПЕЙНИКЪ.

Отечество вся Европа; доставляетъ репейный корень, содержащій много слизи, горькую смолу, инулинъ. Корень длинный, съ волоконцами, покрытъ снаружи черноватою, внутри бѣлою кожицею.

*Запаха* сухой корень не имѣетъ.

*Вкусъ* слизисто-горькій.

Считается средствомъ мочегоннымъ, потогоннымъ, кровочистительнымъ, и употребляется при хроническихъ болѣзняхъ кожи, подагрѣ, ревматизмѣ, и проч.

## ЛУКЪ.

Отечество Азія, Европа; часто употребляется народомъ, какъ средство мочегонное и какъ катаплазмы.

## ЛУКЪ МОРСКОЙ.

Отечество берега Средиземнаго моря; доставляетъ корень морскаго лука, содержащій горькое экстрактивное вещество (сциллитинъ), летучее острое начало, растительную слизь, дубильную кислоту, сахаръ, жиръ. Корень имѣетъ видъ яйце-образной луковицы, пластинчатаго строенія, съ сильнымъ проницательнымъ запахомъ, вызывающимъ слезы. Въ продажѣ существуетъ высушенный лукъ, въ видѣ чешуекъ, мясистыхъ, роговидныхъ, просвѣчивающихъ, безъ запаха, съ противнымъ горькимъ вкусомъ.

*Дѣйствуетъ,* какъ мочегонное, при серозныхъ выпотѣніяхъ, какъ средство грудное и рвотное.

## ЛЮТИКЪ.

Отечество горная страна Германіи и Швейцарія; доставляетъ лютиковую траву, содержащую лютиковую кислоту, аконитинъ, особенное острое вещество, хлорофилъ, смолу, экстрактивное вещество. Корень, имѣющій форму рѣпы, темно-бурый. Стебель прямой, вѣтвистый; листья сверху глянцовитые, зеленые, снизу гладкіе, темно-зеленые; цвѣты синіе большіе.



*Запахъ* свѣжей травы противный, одуряющій.

*Вкусъ* остро-жгучій, раздражающій.

Составляетъ сильное наркотическое, употребляемое какъ средство мочегонное, противо-спазматическое и потогонное.

## МАЙОРАНЪ.

Отечество Греція, Востокъ, Южная Европа; доставляетъ траву, которая содержитъ эѳирное масло, экстрактивное вещество и taнинъ. Стебель прямой, вѣтвистый; листья про-

долговато-яйцевидные, слегка пушистые, сѣро-зеленые; цвѣтки бѣлые.

*Запахъ* особенный, ароматный.

*Вкусъ* напоминаетъ камфору.

## МАКЪ.

Отечество Малая Азія; доставляетъ: маковое масло, служащее приправой; маковыя головки, которыя употребляются преимущественно снаружи; маковое сѣмя идетъ на приготовленіе масла, эмульсій и опіума. Опіумъ есть молочный сокъ, вытекающій при раздавливаньи незрѣлыхъ маковыхъ головокъ; онъ добывается также посредствомъ выжиманья и выварки незрѣлыхъ головокъ и сгущенія на солнцѣ добытаго такимъ образомъ сока. Лучшимъ сортомъ опіума считается восточный. Составныя части опіума слѣдующія: летучее пахучее вещество, морфій, кодеинъ, тебаинъ, наркотинъ, меконинъ, нарцеинъ, опійная кислота,



порфиронинъ, опійная смола, каучукъ, бассоринъ и камедь. Опіумъ употребляется въ разныхъ болѣзняхъ: при пораженіяхъ головнаго и спиннаго мозга, лихорадочныхъ накожныхъ сыпяхъ, ревматизмѣ, подагрѣ, катаррахъ, судорогахъ и боляхъ, неврозахъ и т. д.

## МАКЪ САМОСѢЙКА.



Отечество Европа, Африка, Азія; доставляетъ цвѣты и головки, изъ которыхъ первые идутъ для такъ называемаго маковаго сиропа и для грудныхъ наборовъ. Вторые даются въ видѣ настоя или отвара. Головки собираются, пока еще не созрѣли.

*Дѣйствіе* успокоивающее, хотя въ этомъ макѣ нѣтъ одуряющаго начала, какъ въ бѣломъ.

## МАЛИНА.

Отечество Европа, Сѣверная Азія; доставляетъ ягоды, употребляемыя для малиноваго сиропа. Ягоды содержатъ эѳирное масло, стеароптенъ, лимонную кислоту, красный пигментъ, пектинъ, зернистый сахаръ.

## МАЛЬФЫ, ШТОКРОЗЫ.



Отечество Востокъ, но воздѣлываются и въ Европѣ; доставляютъ мальфовые цвѣты, листья и стебли, содержащіе слизь, красное красящее вещество, экстрактивное начало. Дѣйствуетъ такъ же, какъ калачики (просвирнякъ) и проскурнякъ (алтея.)

## МАСЛИНА, МАСЛИЧНОЕ ДЕРЕВО.

Отечество Южная Европа, Азія, сѣверная Африка; доставляетъ деревянное масло, употребляемое въ пищу, а также для эмульсій въ разныхъ воспаленіяхъ, равнымъ образомъ противъ острыхъ ядовъ. Снаружи, какъ жидкая мазь и пластырь, изъ которыхъ многіе дѣлаются на этомъ маслѣ. Употребляется также для клистировъ.

## МАСТИЧНОЕ ДЕРЕВО.

Отечество Южная Европа, малая Азія; доставляетъ мастику, которая содержитъ эѳирную масляную смолу, и употребляется для жеванья, при зловонномъ дыханіи.

## МАТОЧНАЯ ТРАВА.

Отечество Европа; доставляетъ цвѣты, дѣйствующе сильнѣе ромашки и употребляемые подобно ей.

## МЕДОВКА.

Отечество Южная Европа; доставляетъ траву, содержащую эѳирное масло, горькое экстрактивное начало, слизь.

*Употребляется* премущественно при истерикѣ и для увеличенія мѣсячныхъ очищеній.

## МИНДАЛЬНОЕ ДЕРЕВО,

Отечество Сѣверная Африка, Востокъ, Южная Европа. Извѣстно два сорта миндаля: горькій и сладкій. Горькій содержитъ эѳирное масло, амигдалинъ, жирное масло, эмульсинъ, гликозу. Сладкій миндаль, при помощи толченія и отжиманія, даетъ сладко-миндальное масло; онъ содержитъ много жирнаго масла, бѣлковины, камеди, гликозу, экстрактивное вещество; часто употребляется для приготовленія миндальнаго молока и масла для эмульсій при различныхъ воспаленіяхъ органовъ дыханія, пищеваренія, мочевыхъ и половыхъ. — Горькій миндаль отличается отъ сладкаго величиною, масляно-горькимъ и прянымъ вкусомъ; при растираніи съ водой издаетъ пріятный горько-миндальный запахъ. Цвѣтъ листа желтоватый.—Такъ какъ горько-миндальное эѳирное масло, содержитъ много синильной кислоты, то горькій миндаль даетъ

весьма сильныя лечебныя средства, масло и воду, которыя надобно употреблять очень осторожно.

## МИРРОВОЕ ДЕРЕВО.

Отечество *Верхній Египетъ, Нубія*; доставляетъ мирру, *которая есть ничто иное, какъ засохшій* сокъ; лучшій сортъ Myrrha electa; мирра содержитъ бальзамную смолу, твердую смолу, эѳирное масло, камедь, бассоринъ, яблочную и росно-ладанную кислоты, соли. Въ продажѣ бываетъ кусками различной величины и очертанія, цвѣта красно-бураго; поверхность покрыта пыльнымъ налетомъ; хрупка; въ тонкихъ кускахъ просвѣчиваетъ.

*Запахъ* особенный, бальзамическій, весьма пріятный.

*Вкусъ* пряно-горькій, бальзамическій.

*Дѣйствуетъ* въ небольшихъ дозахъ, какъ средство укрѣпляющее *желудокъ*; въ большихъ пріемахъ возбуждаетъ, и употребляется тогда при атоническихъ пораженіяхъ кишечнаго начала, дѣвичьей блѣдности, меностазіи, хроническихъ легочныхъ болѣзняхъ. Снаружи при торпидныхъ опухоляхъ, антоновѣ огнѣ.

## МОЖЖЕВЕЛЬНИКЪ.

Отечество Сѣверная Европа, Сѣверная Азія; доставляетъ ягоды и дерево можжевельника, содержащіе эѳирное масло, смолу, сахаръ, камедь, кали, известковыя соли.

*Употребляется*, какъ мочегонное средство. Roob Juniperi есть приготовленный изъ ягодъ экстрактъ.

## МОЖЖЕВЕЛЬНИКЪ КАЗАЦКІЙ.

Отечество Европа, Сибирь; доставляетъ траву, которая содержитъ эѳирное масло, камедь, смолу, хлорофилъ, экстрактивное начало, taнинъ, чернильно-орѣшковую кислоту, известковыя соли.

*Дѣйствуетъ* преимущественно на матку и потому употребляется, какъ кровегонное.

## МОЛОЧАЙ.

Отечество Африка, Египетъ, Аравія, Остъ-Индія; доставляетъ камедистую смолу, вытекающую изъ треснувшей коры и потомъ отвердѣвшую на воздухѣ; содержитъ церинъ, каучукъ, яблочную кислоту, кали, известковыя соли. Камедь эта имѣетъ форму неправильныхъ кусочковъ, непрозрачна, хрупка, желтоватаго или буроватаго цвѣта.

*Запаха* не имѣетъ.

*Вкусъ* острый, жгучій.

Принадлежитъ къ сильнымъ ѣдкимъ средствамъ и прежде употреблялась отъ водяной болѣзни, какъ слабительное и рвотное, теперь же употребляется снаружи, какъ нарывное средство.

## МОРКОВЪ.

Отечество Европа, Сѣверная Азія, Сѣверная Америка; со-

держитъ гликозу, каротинъ и эѳирное масло; ея сокъ употребляется, какъ средство растворяющее и смягчающее.

## МУШКАТНИКЪ.

Отечество Молуккскіе острова; доставляетъ: а) Мушкатные орѣхи, содержащіе эѳирное масло, жирное (мушкатное) масло, амиль, камедь, свободныя кислоты; употребляются, какъ возбуждающее средство, при кардіальгіи, коликахъ, вѣтрахъ; большіе пріемы вредно дѣйствуютъ на головной мозгъ и производятъ головокруженіе; б) мушкатный цвѣтъ, содержащій эѳирное масло, желтоватое и красноватое жирное масло, особенную камедистую и крахмалистую субстанцію; употребляется какъ орѣхи.—Мушкатный бальзамъ есть смѣсь желтаго воска, миндальнаго масла, масла мушкатныхъ орѣховъ и масла мушкатнаго цвѣта; его часто втираютъ дѣтямъ въ животъ противъ поноса.

## МЫЛЬНЯНКА.

Отечество вся Европа, доставляетъ траву и корень мыльнянки, содержащіе сапонинъ, не чистую смолу, камедь, и т. д. Форма корня цилиндрическая, искривленная, съ мочками; снаружи цвѣтъ буроватый, внутри желтовато-бѣлый.


*Запаха* нѣтъ.

*Вкусъ* горькій, раздражающій.

Принадлежитъ къ легкимъ тоническимъ, потогоннымъ, растворяющимъ средствамъ, и употребляется при различныхъ накожныхъ болѣзняхъ, ревматизмахъ, страданіяхъ печени.

## НАПЕРСТЯНКА.

Отечество Средняя и Южная Европа; доставляетъ траву пурпуровой наперстянки, содержащую дигиталинъ (алкалоидъ



весьма сильно дѣйствующій на сердцѣ), пикринъ, хлорофилъ, желѣзную недокись, кали, уксусную кислоту, бѣлокъ. Стебель прямой, травянистый; листья продолговатые, яйцеобразные, черенчатые, зазубренные, сверху пушистые, сѣро-зеленоватаго цвѣта, снизу блѣдно-зеленые; цвѣты пурпуровые, рѣдко бѣлые.

*Запахъ* непріятный.

*Вкусъ* горькій, острый.

*Употребляется* при воспаленіяхъ мозга у дѣтей, pericarditis, водяной, болѣзняхъ сердца, нервныхъ страданіяхъ и т. д.

## НОГОТКИ.

Отечество Европа, Востокъ; доставляютъ ноготковые цвѣтки, содержащіе календулинъ, экстрактивное начало, бѣлокъ, камедь, зеленый растительный воскъ, яблочную кислоту, мирицинъ.

Составляютъ слабое разъѣдающее средство, славящееся противъ *рака груди* и *маточнаго влагалища*.

## ОВЕСЪ.

Доставляетъ крупу, которая не рѣдко употребляется въ видѣ декокта. Снаружи идетъ на катаплазмы.

## ОГНЕВИЦА.

Отечество Южная Европа и Сѣверная Африка; доставляетъ корень огневицы, содержащій эѳирное масло, острую мягкую смолу, много инулина, дубильную кислоту, желѣзную окись и марганцевую недокись. Корень цилиндрическій, снаружи буро-сѣрый, внутри бѣлый.

*Запаха* нѣтъ.

*Вкусъ* сильно-жгучій.

Составляетъ сильное раздражающее средство, никогда не употребляемое внутрь.

## ОГУРЕЦЪ ПОЛЕВОЙ.

Отечество Европа; доставляетъ корень, дѣйствующій какъ рвотное, проносное средство, когда даютъ его въ большихъ дозахъ; въ малыхъ пріемахъ дѣйствуетъ, какъ мочегонное и потогонное.

## ОГУРЕЧНАЯ ТРАВА.

Доставляетъ слегка мочегонную и потогонную огуречную траву, богатую кремневой кислотой, селитрой и т. д.

## ОДУВАНЧИКЪ.

Отечество вся Европа; доставляетъ траву и корень одуванчика, содержащіе горькое экстрактивное начало, кристаллизующееся вещество (тараксацинъ), гликозу, инулинъ, свободныя кислоты и соли. Форма корня веретено-образная, цвѣтъ снаружи темно-бурый, внутри молочно-бѣлый.

*Запаха* не имѣетъ.

*Вкусъ* слизисто-горькій.

Одуванчикъ принадлежитъ къ растворяющимъ горькимъ средствамъ, которыя употребляются при такъ называемыхъ завалахъ въ животѣ, болѣзняхъ печени, и проч.

## ОДУРЪ СОННАЯ.



Отечество вся Европа, исключая сѣверную гористую ея часть; доставляетъ траву и корень сонной одури, содержащіе экстрактивное азотистое вещество, атропинъ, растительный бѣлокъ, камедь, смолу, воскъ, клейковину и много солей. Корень длиною въ футъ и болѣе, веретено-образенъ, покрытъ снаружи буроватою

кожицею; въ разрѣзѣ замѣтенъ сначала бѣловатый слой, потомъ темно-бурое кольцо, а за нимъ бѣлая сердцевина. Стебель вѣтвистый, до 5 фут. вышиною; листья черенчатые, яйцевидные, цвѣта темно-зеленаго; цвѣты темно-красные.

*Запаха* сухой корень и трава не имѣютъ.

*Вкусъ* травы горьковато-острый, а корня горьковатый непріятный, остро-раздражающій.

Сонная одурь принадлежитъ къ весьма сильнымъ наркотическимъ средствамъ, которыя дѣйствуютъ преимущественно на мозгъ и на органы чувствованій. Употребляется при неврозахъ, водобоязни, удушьѣ, желудочныхъ судорогахъ, различныхъ пораженіяхъ глазъ, напр., при воспаленіи радужной оболочки, и, какъ предохранительное средство, при скарлатинѣ. Снаружи сонная одурь употребляется для расширенія зрачка при операціи катарракта, при судорожныхъ пораженіяхъ маточнаго влагалища, и т. д.

## ОСОКА ПЕСОЧНАЯ.

Отечество Германія; доставляетъ корень песочной осоки, называемый также нѣмецкимъ сассапарилемъ; онъ содержитъ слизистое экстрактивное вещество, мягкую смолу, амиль. Корень ползучій, очень длинный, узловатый, снаружи красный, внутри бѣлый.

*Запаха* не имѣетъ.


*Вкусъ* слабо раздражающій и мучнистый.

Составляетъ горькое слизистое средство, дѣйствующее особенно на кожу и почки; употребляется противъ сифилиса, подагры, золотухи, хроническихъ накожныхъ болѣзней.

## ОСТРОЛИСТЪ.

Отечество Южная Германія; доставляетъ илицинъ, хорошо дѣйствующій противъ перемежающейся лихорадки. Изъ листьевъ приготовляется винный настой ($3^1/_2$ золотн. листьевъ), который дается передъ пароксизмомъ.

## ПАПОРОТНИКЪ.



*Отечество* вся Европа, Сѣверная Азія, Сѣверная Африка; доставляетъ корень папоротника, содержащій темно-зеленое и свѣтло-зеленое жирное масло, танинъ, сахаръ, яблочную кислоту, и т. д.; въ большихъ пріемахъ производитъ рвоту, поносъ; свѣжій корень составляетъ хорошее средство противъ ленточныхъ глистъ. Корень горизонтальный, большой, усѣянный чешуйками, волокнистый. Собирается съ мая по сентябрь и употребляется преимущественно въ свѣжемъ видѣ.

*Запахъ* свѣжаго корня непріятный.

*Вкусъ* сперва слизисто-сладковатый, потомъ отвратительно-горькій, островатый, вяжущій.

## ПАСЛЕНЪ СЛАДКО-ГОРЬКІЙ.

Отечество почти вся Европа; доставляетъ верхушки паслена, содержащія особенное экстрактивное вещество, камедистое экстрактивное вещество, зеленый воскъ, клейковину, соланинъ и соли. Стебли цилиндрической формы, морщинисты, толщиною въ перо, желтовато-сѣраго цвѣта, внутри пушистые.

*Запаха* сухіе стебли не имѣютъ.

*Вкусъ* горьковато-сладкій, раздражающій.

*Дѣйствуетъ* преимущественно на кожу и употребляется при хроническихъ накожныхъ сыпяхъ, ревматизмѣ, дискразіи.

## ПЕРЕСТУПЕНЪ.

Отечество Европа; доставляетъ корень, употреблявшійся какъ колоцинты; составляетъ весьма сильное средство и играетъ важную роль въ гомеопатіи.

## ПЕРЕЦЪ ЧЕРНЫЙ.

Отечество Остъ-Индія; доставляетъ бѣлый и черный перецъ. Послѣдній есть не зрѣлыя, зеленыя, высушенныя ягоды перца, а бѣлый—зрѣлыя ягоды. Онъ содержитъ пиперинъ, острое, твердое масло и эѳирное масло. Форма бѣлаго перца—шаро-образная, гладкая, цвѣтъ бѣловатый.

*Запахъ* чернаго и бѣлаго перца ароматный.

*Вкусъ* чернаго жгучій, остро-пряный, бѣлаго такой же жгучій, но слабѣе, чѣмъ у чернаго.

Пиперинъ въ новѣйшее время употребляется противъ перемежающейся лихорадки. Въ видѣ кашки, перецъ долженъ хорошо дѣйствовать противъ *геморроя* ($2^1/_4$ *золот.* чернаго перца съ достаточнымъ количествомъ меда).

## ПЕРЕЦЪ ДЛИННЫЙ.

Есть ничто иное, какъ не зрѣлыя высушенныя плодовыя вѣточки перечнаго куста. Рѣдко употребляются.

## ПЕРЕЦЪ ТУРЕЦКІЙ.

Отечество Америка, Остъ и Вестъ-Индія; доставляетъ стручья турецкаго перца, содержащіе смолу, воскъ, экстрактивное вещество, камедь, бѣлокъ. Плодъ имѣетъ видъ безсочной ягоды, формы продолговатой, съ сѣменами внутри; цвѣтъ красный блестящій; сѣмена почковидныя бѣлыя. Пыль плода, попадая въ носъ, производитъ чиханье и зудъ, а отъ

приложенія къ кожѣ турецкаго перца происходитъ раздраженіе, краснота и воспаленіе кожи, характеризуемое образованіемъ пузырей.

*Запахъ* плода почти не замѣтенъ.

*Вкусъ* жгучій, острый, пряный.

Составляетъ очень острое средство.

## ПЕРСИКЪ.

Доставляетъ цвѣты, служащіе легкимъ слабительнымъ и успокоивающимъ средствомъ.

## ПЕРУАННИКЪ.

Отечество Южная Америка, особенно Перу и Новая Гранада; доставляетъ перувіанскій бальзамъ, получаемый посредствомъ вывариванья съ водою частей растенія. Онъ содержитъ эѳирное масло, смолу, росноладонную кислоту, и т. д. Имѣетъ видъ густой жидкости, красновато-бураго цвѣта.

*Запахъ* пріятный, похожій на запахъ роснаго ладона, или ванили.

*Вкусъ* остро-ароматный, горячительный.

Принадлежитъ къ легкимъ возбуждающимъ и дѣйствуетъ преимущественно на слизистую оболочку дыхательныхъ путей, а потому употребляется при катаррахъ. Снаружи употребляется противъ злокачественныхъ разрушительныхъ нагноеній.

## ПЕТРУШКА.

Отечество Южная Европа; доставляетъ петрушечное сѣмя, содержащее эѳирное масло, стеаринъ, экстрактивное вещество, слизь, бѣлокъ, и т. д.

*Запахъ* сѣмени ароматный, особенный петрушечный.

*Вкусъ* горьковато-пряный.

*Употребляется*, какъ мочегонное.

## ПІОНЪ.

Отечество Южная Европа; доставляетъ корень піона, содержащій особенное, острое, летучее вещество, камедь, таннинъ, сахаръ, протеиновую субстанцію, жирное вещество, соли. Корень похожъ на мясистый клубень, толстъ, снаружи желто-бурый; внутри бѣлый.

*Запахъ* противный.

*Вкусъ* остро-горькій.

*Полезенъ* противъ падучей болѣзни.

## ПЛАУНЪ.

Отечество Европа; доставляетъ плаунное сѣмя, содержащее особенное смолистое вещество (полленинъ), жирное масло, сахаръ, слизистый экстрактъ. Сѣмя въ порошкѣ, представляется блѣдно-желтымъ, состоитъ изъ микроскопическихъ сѣменъ; на огнѣ горитъ яркимъ пламенемъ; плаваетъ на поверхности воды, не смѣшиваясь съ нею; въ спирту тонетъ.

*Запаха* и *вкуса* не имѣетъ.

*Употребляется* противъ моче-задержанія, вѣтровъ, особенно у дѣтей. Снаружи, какъ присыпка для дѣтей.

## ПОДОРОЖНИКЪ БОЛЬШОЙ.


Отечество Европа, Азія, Америка; доставляетъ подорожниковую траву; принадлежитъ къ слизистымъ, весьма слабо стягивающимъ средствамъ; употребляется только свѣже-выжатый и отстоенный сокъ растенія, противъ глазныхъ болѣзней.

## ПОЛЫНЪ.

Отечество Европа; доставляетъ полынную траву, содержащую кристаллизующееся горькое начало, эѳирное масло, слизь, смолу, камедь, уксусную кислоту, соли, кали, известь. Дѣйствуетъ, какъ возбуждающее горькое, особенно при несвареніи пищи и перемежающейся лихорадкѣ.

## ПОМЕРАНЦЕВОЕ ДЕРЕВО.

Отечество Остъ-Индія, Китай, воздѣлывается также въ



Европѣ; доставляетъ: а) померанцевый цвѣтъ, изъ котораго приготовляется вода померанцовыхъ цвѣтовъ, средство ароматическое, противоспазматическое; цвѣты содержатъ эѳирное масло, горькое экстрактивное вещество, камедь, свободную уксусную кислоту, и т. д. б) померанцевые листья, употребляемые въ видѣ чая при неврозахъ, истерикѣ, и т. д.; содержатъ эѳирное масло и горькое экстрактивное вещество; в) незрѣлые померанцы, употребляемые, какъ горько-тоническое средство; содержатъ авранцинъ, чернильно-орѣшковую, лимонную и яблочную кислоты, гликозу, гесперидинъ, и т. д.; г) померанцевую корку, содержащую эѳирное масло, горькое экстрактивное вещество, гесперидинъ, смолу; составляютъ тоническое, укрѣпляющее желудокъ средство, которое часто дается вмѣстѣ съ другими. Корка имѣетъ цвѣтъ оранжевый снаружи, бѣловатый внутри; въ тонкой кожицѣ корки находится много ячеекъ, въ которыхъ заключается эѳирное масло; *запахъ* пріятный, ароматный; *вкусъ* горько-пряный, пріятный. Цвѣты пазушные, лепестки зеленые, бѣлые, мясистые; *запахъ* пріятный, ароматный; *вкусъ* горьковато-пряный.

## ПОТОГОНЪ.

Отечество Южная Германія; доставляетъ корень потогона, содержащій императоринъ, эѳирное масло, камедь, смолу, крахмалъ, соли. Корень цилиндрическій, многоглавый, кольчатый, съ отпрысками; цвѣтъ его бурый, внутри блѣдно-желтый.

*Запахъ* ароматный, сильный.

*Вкусъ* остро-пряный.

Составляетъ тоническое, возбуждающее.

## ПРОСКУРНЯКЪ.

Отечество Южная Европа; доставляетъ траву и корень проскурняка. Трава содержитъ слизь; корень также заключаетъ слизь, аспарагинъ, амиль, сахаръ, жирное масло, бѣлокъ, пектиновую кислоту. Корень цилиндрическій, съ длинными вѣтвями; снаружи сѣро-желтоватаго цвѣта, внутри бѣлаго.

*Запахъ* слабый.

*Вкусъ* слизисто-горьковатый.

Трава *употребляется* для катаплазмъ, какъ средство смягчающее. Корень употребляется при воспаленіяхъ дыхательнаго органа, кишечнаго канала, мочеваго и половыхъ органовъ.

## ПРОСТРѢЛЪ.

Отечество Средняя и Сѣверная Европа; доставляетъ траву прострѣла, содержащую анемонинъ, анемониновую кислоту, танинъ; цвѣтки въ видѣ колокольчиковъ, темно-фіолетовые.

*Запахъ* свѣжаго растенія острый и сильный.

*Вкусъ* жгучій. Сухое почти не имѣетъ вкуса и запаха.

Острое начало этого растенія *дѣйствуетъ* преимущественно на кожу и слизистыя перепонки, а также на нервную систему; употребляется при болѣзняхъ глазъ, ревматизмѣ, застарѣломъ сифилисѣ.

## ПШЕНИЦА.

Доставляетъ крахмалъ, употребляемый преимущественно въ клистирахъ при поносѣ.

## ПШЕНИЦА ПОЛЗУЧАЯ.

Отечество вся Европа; доставляетъ пырей; содержитъ слизь и камеде-сахаръ, также гумми, крахмалъ, клейковину и соли. Корень суставчатый, внутри пустой, длиною 2—6 фут. толщиною въ соломенку; цвѣтъ желто-блѣдный.

*Запаха* не имѣетъ.

*Вкусъ* слизистый, слегка сладковатый.

*Употребляется*, какъ средство обволакивающее, утишающее и разрѣшающее, при различныхъ воспаленіяхъ, а также какъ легкое мочегонное.

## РАТАНГА.

Отечество Америка, Перу; доставляетъ ратанговый корень; содержитъ дубильную кислоту, особенное экстрактивное на-

чало, гумми; корень имѣетъ форму клубневиднаго, бугристаго стержня, длиною въ 8 дюймовъ, толщиною въ 2 дюйма; отъ него идутъ цилиндрическія вѣтви, длиною до 2 футовъ, толщиною въ мизинецъ. Кора корня толщиною отъ половины до одной линіи, цвѣта красно-бураго; внутреннее вещество вязкое, волокнистое, цвѣта желто-краснаго.


*Запаха* корень не имѣетъ.

*Вкусъ* сильно-вяжущій, слегка горьковатый.

*Составляетъ* сильное стягивающее средство, употребляемое преимущественно противъ кровотеченій.

## РЕВЕНЪ.

Отечество Гималай, Китай, Тартарія; доставляетъ ревенный корень, содержащій дубильную и чернильно орѣшковую кислоты, экстрактивное вещество, гликозу, смолу, камедь, известковыя соли. Лучшій сортъ ревеня — русскій, представляющій куски копытчатаго, цилиндрическаго или веретено-образнаго очертанія; покрыты желтоватою пылью и



продырявлены. Внутри цвѣтъ желтый, съ красноватыми и бѣлыми жилками, какъ бы мраморный.

*Запахъ* непріятный, особенный, ревенный.

*Запахъ* горьковато-вяжущій, непріятный.

*Употребляется,* какъ средство тоническое и слабящее, особенно при поносахъ, разстройствѣ пищеваренія.

## РИСЪ.

Отечество Америка, Европа; доставляетъ рисъ, который менѣе другихъ породъ зерноваго хлѣба даетъ пищевыхъ остатковъ; рисовая вода есть извѣстное средство противъ поноса.

## РОЖЪ.

Отечество Кавказъ; доставляетъ водку, спиртъ, ржаную муку, употребляемую, какъ ячменная мука.

## РОЗА ЦЕНТИФОЛЬНАЯ.

Отечество Восточный Кавказъ: доставляетъ розовые лепестки, содержащіе эѳирное масло, танинъ и красящее вещество; употребляются для приготовленія розовой воды и меда.

## РОЗА ГАЛЛЬСКАЯ.

Отечество Южная Европа и Кавказъ; доставляетъ лепе-

стки красной розы, содержащіе эѳирное масло, жиръ, бѣлокъ, танинъ и красящее вещество, чернильно-орѣшковую кислоту; употребляется для приготовленія розоваго уксуса и консервовъ.

## РОЗА МУСКУСНАЯ.

*Отечество* Остъ-Индія; доставляетъ розовое масло, состоящее изъ жидкой, сильно пахнущей, растворимой въ алкоголѣ составной части, и другой части, твердой, менѣе пахучей и трудно растворимой въ алкоголѣ. Розовые лепестки можно считать за легкое стягивающее средство. Розовое масло болѣе употребляется парфюмерами.

## РОЗМАРИНЪ.

*Отечество* Южная Европа; доставляетъ траву и масло розмариновыя, употребляемыя большею частію снаружи. Кустарникъ вѣтвистъ, величиною около 3 фут. и болѣе; листья противоположные, кожистые, слегка морщинистые, сверху темно-зеленаго цвѣта, а снизу бѣлаго и покрыты пухомъ; длиною около 1 дюйма.

*Запахъ* ароматный, напоминающій камфору.

*Вкусъ* пряно-горьковатый.

Трава *употребляется* въ видѣ чая, около золотника на 2 чашки. Раздражающее масло должно по словамъ нѣкоторыхъ употреблять по 10 капель, какъ мочегонное средство.

## Ромашка

Отечество вся Европа; доставляетъ цвѣты, содержащіе темно-синее эѳирное масло, темное, мыло-образное, экстрактивное вещество, горькое начало, смолу, камедь, воскъ, хлорофилъ, жиръ и соли; употребляется, какъ горькое противоспазматическое, при болѣзняхъ нижней части живота, истерикѣ, вѣтрахъ, прекращеніи регулъ, также при различныхъ болѣзняхъ какъ потогонное. Снаружи для травныхъ мѣшечковъ, при ревматическихъ боляхъ глазъ, опухоляхъ и т. д. Равнымъ образомъ для клистировъ, ваннъ, и т. п.

## Ромашка римская

Отечество Южная Европа; доставляетъ цвѣты, содержащіе эѳирное масло, хлорофилъ, смолу, жиръ, горькое экстрактивное начало, бѣлокъ, камедь, и т. д. Она дѣйствуетъ подобно предыдущей, но менѣе горячитъ.

## Росно-ладонное дерево.

Отечество Ява, Суматра; доставляетъ росной ладанъ, сокъ, вытекающій изъ надрѣзовъ и потомъ твердѣющій на воздухѣ; онъ содержитъ темную и желтую смолы, кислоту, экстрактивное вещество. Бываетъ двухъ сортовъ: въ зернахъ и въ кускахъ. Первый сортъ имѣетъ форму неправильную, въ видѣ плоскихъ кусковъ, цвѣтъ ихъ снаружи темновато-желтоватый, внутри бѣлый блестящій. Другой сортъ представляетъ неправильные куски скважистаго строенія.

*Запахъ* роснаго ладана весьма пряный.

*Вкусъ* бальзамическій, острый.

*Употребляется* для окуриваній и на приготовленіе дѣвичьяго молока.

## КУТА.

Отечество Южная Европа, Сѣверная Африка; доставляетъ траву, содержащую эѳирное масло, экстрактивное вещество, протеиновую субстанцію, крахмалъ, бѣлокъ, яблочную кислоту. Листья многообразно-сложные, цвѣта сине-зеленаго или сѣро-зеленаго.

*Запахъ* противный, особенный, проницательный.

*Вкусъ* слабо-ароматный, но вмѣстѣ съ тѣмъ остро-горькій.

*Дѣйствуетъ* раздражающимъ образомъ и прежде употреблялось, какъ средство кровогонное и противо-гнилостное.

## РЯБИНА ДИКАЯ.

Отечество вся Европа; доставляетъ листья и цвѣты; содержатъ горькое экстрактивное начало, танинъ, гликозу, бѣлокъ и т. д. Стебель прямой.

*Запахъ* непріятно-ароматный.

*Вкусъ* пряный.

*Употребляется*, какъ противо-глистное средство.

## САБАДИЛЛА, ИЛИ КИТАЙСКАЯ ЧЕМЕРИЦА.

Отечество Мехика; доставляетъ сабадилловыя сѣмена, содержащія вератринъ, сабадилловую кислоту, чернильно-

орѣшковую кислоту, экстрактивное начало, желтое красящее вещество, камедь, и т. д. Сѣмена продолговатыя, немного сплюснутыя, съ одной стороны плоскія, съ другой выпуклыя, цвѣтъ черно-бурый, лоснящійся, внутри бѣлый.

*Запаха* нѣтъ.

*Вкусъ* очень острый и горькій.

*Дѣйствуетъ*, какъ обыкновенная чемерица.

## САГОВАЯ ПАЛЬМА.

Отечество Остъ-Индія, Мадагаскаръ; доставляетъ саго. Сердцевина этого растенія, размѣшанная въ водѣ, высушенная и превращенная въ порошокъ, даетъ тѣсто, если смѣшать этотъ порошекъ съ водою; тѣсто пропускаютъ чрезъ сито и превращаютъ въ зерна. Саго составляетъ легкую пищу, которую съ пользою употребляютъ при выздоровленіи. Изъ картофельнаго крахмала дѣлаютъ родъ саго, которое подмѣшиваютъ къ настоящему.

## САНДАЛЪ КРАСНЫЙ.

Отечество Остъ-Индія; доставляетъ красный сандалъ, содержащій санталинъ. Стволъ привозится въ огромныхъ кускахъ, плотенъ, тяжелъ; цвѣтъ красный, кровавый.

*Запахъ* слабый ароматный.

*Вкусъ* слабо-вяжущій.

Принадлежитъ къ числу слабыхъ стягивающихъ.

## САНДАЛЪ ЖЕЛТЫЙ.

Отечество Бразилія; доставляетъ фернамбукъ; имѣетъ видъ кусковъ различной величины, тяжелыхъ, снаружи красно-бураго, внутри краснаго цвѣта.

*Запаха* нѣтъ.

*Вкусъ* слабо-вяжущій.

Прежде употребляется при перемежающихся лихорадкахъ теперь же идетъ на приготовленіе красныхъ чернилъ.

## САНДАРАКОВЫЙ КУСТЪ.

Отечество Сѣверная Африка; доставляетъ сандаракъ, содержащій смолу, эѳирное масло.

*Употребляется* для окуриваній.

## САССАПАРЕЛЬ.

Отечество Южная Америка, Вестъ-Индія; доставляетъ сассапарель, содержащую горькую смолу, экстрактивное начало, крахмалъ, особенную субстанцію (смилацинъ), эѳирное масло, гликозу. Имѣетъ видъ сѣро-желтоватыхъ или красноватыхъ мочекъ; корковый слой мучнистъ; сердцевина бѣлая.

*Употребляется* главнымъ образомъ, какъ мочегонное и потогонное средство, при сифилисѣ, ревматизмѣ, золотухѣ, подагрѣ, накожныхъ болѣзняхъ.

## САССАФРАСЪ.

Отечество Америка; доставляетъ сассафрасъ, богатый эѳирнымъ масломъ; стволъ покрытъ коричневою, морщинистою корой; вещество его мягко и губчато.

*Запахъ* ароматный.

*Вкусъ* пряный, раздражающе-острый.

*Употребляется*, какъ потогонное, при застарѣломъ сифилисѣ, подагрѣ и ревматизмѣ.

## САФЛОРЪ.

Доставляетъ цвѣты, часто примѣшиваемые къ шафрану.

## СЕНЕГА.

Отечество Сѣверная Америка, Канада; доставляетъ корень, содержащій сенегинъ, полигальную кислоту, бѣлокъ, камедь, два смолистыя начала, полигалинъ и изолузинъ, дубильную кислоту, пектиновую кислоту, цеpинъ и соли. Корень узловатъ, съ мочками, кривой; слабый.

*Запахъ* и *вкусъ* раздражающій, производящій слюнотеченіе.

*Дѣйствуетъ* преимущественно на систему лимфатическихъ железъ, на органы кожи и мочевые, и на слизистую оболочку дыхательнаго аппарата, поэтому, употребляется при катаррахъ, и д. т., а также при грудной водянкѣ, какъ мочегонное средство.

## СИМАРУБА.

Отечество Америка, Гвіана; доставляетъ кору, которая содержитъ горькое экстрактивное вещество (квассинъ), эѳирное масло, имѣющее запахъ роснаго ладана, слизь, ульминъ различныя соли. Кора имѣетъ видъ плоскихъ кусковъ; вещество коры волокнисто, рыхло, гибко; кожица сѣро-желтоватая; внутри цвѣтъ буро-сѣрый.

*Запаха* нѣтъ.

*Вкусъ* горько-слизистый.

Въ небольшихъ дозахъ составляетъ тоническое средство, въ большихъ легко производитъ рвоту и поносъ; употребляется при хроническихъ поносахъ.

## СКАММОНІЙ.

Отечество Малая Азія, Греція; доставляетъ скаммоній, содержащій смолу, камедь, амиль, экстрактивное вещество съ солями, бассориномъ, клейковиною, бѣлкомъ, и т. д. Бываетъ различныхъ сортовъ, изъ которыхъ лучшимъ считается алеппскій скаммоній, представляющій не равные куски различной величины, хрупкіе, скважистые; цвѣтъ темно-сѣрый; покрыты зеленоватымъ налетомъ.

*Запахъ* слабый непріятный.

*Вкусъ* раздражающій.

*Дѣйствуетъ* сильнѣе ялаппы.

## СЛИВА.

Доставляетъ мякоть сливъ.

## СОКОЛКА.

Отечество Южная Европа; доставляетъ сѣмя, содержащее дельфининъ, стафизагринъ, летучее жирное масло, экстрактивное вещество, протеиновую субстанцію. Сѣмена величиною въ горошину, неправильной формы, трехстороннія, съ одной стороны выпуклыя, съ другой острыя; снаружи цвѣтъ буроватый, внутри бѣлый.

*Запахъ* слабый непріятный.

*Вкусъ* остро-жгучій и раздражающій.

Дельфининъ составляетъ сильное разъѣдающее средство, похожее на вератринъ.

## СОЛОДКА.

Отечество Германія; доставляетъ солодковый корень, содержащій сладкое экстрактивное начало, мягкую смолу, жирное масло, амиль. Корень двухъ родовъ; первый имѣетъ форму цилиндрическую, волокнистое строеніе, цвѣтъ желто-блѣдный, безъ кожицы. Второй родъ также имѣетъ цилиндрическій видъ, цвѣтъ желтый, съ кожицею.

*Вкусъ* перваго сладкій, лакричный, вкусъ втораго сладкій, но менѣе пріятный, чѣмъ у перваго.

*Дѣйствуетъ*, какъ легкое слабительное и способствующее отдѣленію мокротъ; употребляется при болѣзняхъ слизистой оболочки, особенно при катарральномъ пораженіи грудныхъ органовъ.

## СОСНА ПРИМОРСКАЯ.

Доставляетъ бордосскій терпентинъ и канифоль.

## СОСНА.

Отечество Сѣверная Европа; доставляетъ канифоль и терпентинъ, содержащіе эѳирное масло, танинъ, смолу, экстрактивное начало, канифольную и янтарную кислоты. Она даетъ также сосновые побѣги, содержащіе смолу, эѳирное масло, танинъ, и т. д., и дѣйствующіе какъ мочегонное и потогонное.

## СОСНА СИБИРСКАЯ.

Доставляетъ а) бургундскую смолу, приготовляемую растапливаніемъ вытекающаго сока; содержитъ пининъ, эѳирное масло, смолу; употребляется для пластырей. б) Обыкновенный терпентинъ. в) Терпентинное масло, добываемое дестилляціей изъ терпентина, оно содержитъ два изомерныя масла, изъ которыхъ одно, образующее съ хлоро-водородомъ твердое соединеніе, называется Dadyl, а образующее жидкое соединеніе—Peucyl.

## СПОРЫНЬЯ.

Содержитъ эргатинъ, фунгинъ, спіаринъ, церинъ, красное красящее начало, бѣлокъ, экстрактивное начало, соли. Подъ словомъ спорынья разумѣется болѣзненное перерожденіе яичниковъ злаковыхъ растеній; другіе же утверждаютъ, что это грибъ, выростающій на яичникѣ злаковыхъ растеній и препятствующій ихъ развитію и оплодотворенію. Въ медицинѣ употребляется только спорынья, выростающая на ржи. Она образуется преимущественно въ дождливое, холодное лѣто, подъ вліяніемъ теллурическихъ условій, намъ мало извѣстныхъ.

*Дѣйствуетъ*, какъ сильное наркотическое, и потому требуетъ осторожности; употребляется преимущественно при родахъ, кровотеченіяхъ изъ матки, меностазіи, дисменорреи и аменорреи.

## СТИРАКСА.

Отечество Сирія, Аравія; доставляетъ твердую стираксу, содержащую эѳирное масло, двѣ смолы, экстрактивное вещество, росноладанную кислоту, и т. д.

*Употребляется* для обкуриванья.

## ЦАРЕГРАДСКІЙ СТРУЧЕЧНИКЪ.

Отечество Сирія, Египетъ, воздѣлывается и въ Европѣ; доставляетъ сахарные цареградскіе стручки, содержащіе гликозу, камедь, экстрактивное начало и танинъ; нерѣдко употребляется для груднаго чая, при грудныхъ болѣзняхъ.

## ТАБАКЪ.

Отечество Южная Америка, воздѣлывается и въ Европѣ; доставляетъ табачные листья, содержащіе никотинъ, табачную камфору, экстрактивное вещество, сѣрую смолу, растительный бѣлокъ, крахмалъ, яблочную кислоту и соли. Корень одногодный, стволъ прямый, вѣтвистый, цилиндрическій, вышиною отъ 3 до 4 фут., покрытъ пухомъ; листья сидящіе, продолговатые, ланцето-образные, остроконечные; вѣнчикъ воронко-образный.

*Запахъ* особенный табачный.

*Вкусъ* отвратительный, горько-острый.

Высушенные листья цвѣта зелено-бураго; сухіе листья блѣдно-зеленаго цвѣта.

Составляетъ раздражающее отуманивающее средство, производитъ рвоту и поносъ; опасное средство, которое уже въ малыхъ дозахъ можетъ имѣть дурныя слѣдствія.

## ТАМАРИНДЪ.

Отечество Остъ-Индія, Аравія, Египетъ; доставляетъ плодъ, содержащій кислое винокислое кали, лимонную и яблочную кислоты, сахаръ, камедь, и т. д. Плодъ имѣетъ продолговатую полулунную форму; внутри раздѣленъ перегородками, между коими лежатъ сѣмена. Мякость бураго цвѣта; снаружи находится буро-сѣрая кожица.

*Запахъ* слабый.

*Вкусъ* кисло-сладкій, прохлаждающій.

*Употребляется*, какъ средство прохлаждающее, ослабящее, при желудочно-желчныхъ состояніяхъ.

## ТЕРНЪ.

Доставляетъ цвѣты, составляющіе легкое слабительное.

## ТИМЬЯНЪ.

Отечество вся Европа; доставляетъ богородскую траву, серполетъ, оба богатые эѳирнымъ масломъ. Стебель вѣтвистый, листья небольшіе, продолговатые, сверху зеленые, снизу бѣловатые; цвѣты красно-бѣлые.

*Запахъ* пріятный.

*Вкусъ* жгучій, пріятный.

*Употребляется*, какъ средство раздражающее и для дѣтскихъ ваннъ.

## ТМИНЪ.

Отечество вся Европа; доставляетъ тминное сѣмя, весьма богатое эѳирнымъ масломъ. Сѣмена продолговатыя, съ концовъ утонченныя, полосатыя, но гладкія, цвѣтомъ буровато-сѣрыя.

*Запахъ* пріятный, ароматный.

*Вкусъ* пріятный.

## ТМИНЪ РИМСКІЙ.

Отечество Эѳіопія, Египетъ; доставляетъ римскій тминъ, содержащій эѳирное масло, экстрактивное вещество, и т. д.

*Употребляется*, какъ и предыдущій, противъ пученья живота, разстройства пищеваренія.

## ТОЛОКНЯНКА.

Отечество Средняя и Сѣверная Европа, Сѣверная Америка; доставляетъ листья, содержащіе дубильную и чернильно-орѣшковую кислоты, экстрактивное вещество, смолу, хлорофилъ, камедь. Стебель лежащій; листья очередные, обратно-яйцевидные, снизу желтые, вѣчно зеленые. Ягода красная, шаровидной формы, съ пятью косточками.

*Запаха* нѣтъ.

*Вкусъ* горькій и сильно-вяжущій.

Принадлежитъ къ стягивающимъ средствамъ, которыя имѣютъ специфическое дѣйствіе на мочевые органы, и потому употребляется при нагноеніяхъ почекъ и мочеваго пузыря, слизетеченіи, геморроѣ, кровотеченіяхъ изъ мочеваго пузыря, а также, какъ средство мочегонное при водяной.

## ТОЛСТУШКА.

Отечество Южная Европа; доставляетъ блошное сѣмя, богатое слизью, которая добывается наливаньемъ 1 золотника травы 42 золотниками холодной воды, и употребляется, какъ наружное средство.

## ТОЛУТАНСКІЙ БАЛЬЗАМНИКЪ.

Отечество Новая Гранада и саванны Толу; доставляетъ толутанскій бальзамъ. Гуще перувіанскаго, на воздухѣ сохнетъ въ хрупкую смолу; цвѣтъ красно-бурый.

*Запахъ* весьма пріятный, похожій на запахъ перувіанскаго бальзама.

*Вкусъ* смолистый, слегка раздражающій.

Его составныя части, дѣйствіе и употребленіе такія же, какъ перувіанскаго бальзама.

## ТРИФОЛЬ.

Отечество почти вся Европа; доставляетъ трифольную траву, содержащую меніантинъ, протеиновую субстанцію, зеленый крахмалъ, сѣрую камедь, уксусно-кислое кали и свободную яблочную кислоту. Листья длинно-черешковые, тройные; цвѣты въ видѣ кисти, расположены на стрѣлкѣ; вѣнчикъ воронко-образный, блѣдно-розоваго цвѣта.

*Запаха* сухая трава не имѣетъ, свѣжая же пахнетъ пріятно.

*Вкусъ* сильно-горькій, чистый.

*Дѣйствуетъ* и *употребляется* подобно золототысячнику.

## ТРУТЪ, БЕРЕЗОВАЯ ГУБКА.

Отечество Европа; доставляетъ трутъ, содержащій измѣненный фунгинъ, экстрактивное начало, соли. *Употребляется* снаружи, какъ средство, останавливающее кровь.

## ТУТОВОЕ ДЕРЕВО, ШЕЛКОВИЦА.

Отечество Персія, Южная Европа; доставляетъ шелковичныя ягоды, содержащія фіолетовый, экстрактивный пигментъ, сахаръ, слизь, растительныя кислоты. *Употребляются* для шелковичнаго сыропа.

## ТЫСЯЧЕЛИСТНИКЪ.

Отечество Европа, Сѣверная Африка; доставляетъ траву и цвѣты; содержатъ синее эѳирное масло, экстрактивное начало, бѣлокъ, смолу, камедь, хлорофилъ, дубильную и яблочную кислоты, соли.

*Дѣйствуетъ* подобно ромашкѣ и употребляется преимущественно при прекращенныхъ регулахъ, геморроѣ, ипохондріи и т. д.

## УКРОПЪ.

Отечество Сирія, но растетъ въ Европѣ; доставляетъ укропное сѣмя, содержащее эѳирное масло, жирное масло, смолу, экстрактивное вещество. Плодъ продолговато-яйцеобразный, съ одной стороны выпуклый, а съ другой вогнутый, ребристый, зеленоватый.

*Запахъ* пріятно-ароматный, укропный.

*Вкусъ* сладко-пряный, похожій на анисъ.

*Дѣйствуетъ* на слизистую оболочку дыхательныхъ и пищеварительныхъ органовъ.

## ФАСОЛЬ.

Отечество Ость-Индія, но воздѣлывается и въ Европѣ; доставляетъ бобы, содержащіе крахмалъ, легуминъ, чернильно орѣшковую кислоту, гликозу, животныя и жирныя субстанціи. *Употребляется* для присыпки рожи.

## ФІЯЛКА.

Отечество Азія, Европа; доставляетъ фіялковые цвѣты,



содержащіе віолинъ (начало, возбуждающее рвоту), синее красящее вещество, гумми, бѣлковину, и проч. Растеніе безстебельчатое, листья широкіе, сердце-видные; цвѣты фіолетовые, рѣдко бѣлые.

*Запахъ* пріятный.

*Вкусъ* острый, горьковато-сладкій.

До сихъ поръ употребляются, какъ чай, при катаррахъ, и, какъ слабое потогонное средство, при различныхъ сыпяхъ, по полтора золотника на 2 чашки. Цвѣты идутъ преимущественно на приготовленіе фіялковаго сиропа.

## ФІЯЛКОВЫЙ КОРЕНЬ.

Отечество Южная Европа; получается отъ растенія iris florentina и содержитъ острую смолу, эѳирное твердое мас-

ло, экстрактивное начало. Корень душистый, шишковатый, толщиною отъ половины до 1 дюйма, длиною три дюйма; существо его бѣлое съ смолистыми почками.

*Запахъ* пріятно-ароматный.

*Вкусъ* слизистый, а потомъ горьковато-острый.

Въ свѣжемъ состояніи слегка возбуждаетъ рвоту; въ высушенномъ видѣ употребляется противъ легочнаго и бронхіальнаго катарра.

## ХИННАЯ КОРКА.

Отечество Перуанскіе Анды Есть нѣсколько сортовъ хины, именно: коричневая хинная корка, илаписо, царская, красная хинная корка, гоха богатая хининомъ и цинхониномъ. Царская содержитъ больше всѣхъ хинина, а красная оба алколоида въ одинаковомъ количествѣ. Хина содержитъ хининъ, цинхонинъ, хинную кислоту, хинный пигментъ, твердую смолу, камедь, жирную зеленую субстанцію и соли, и т. д.—1) Бурыя или сѣрыя хинныя корки; ихъ находится нѣсколько сортовъ; куски отъ 3 до 18 дюймовъ длины, свернуты въ трубку; толщина корки отъ 1$^1/_3$ до 4 линій. Кожица на корѣ бѣловатаго или бѣло-сѣраго цвѣта, съ темно-сѣрыми пятнами; поверхность морщинистая, съ поперечными трещинами. Корковый слой сѣро-бурый или сѣрый, а лубъ бурый. *Запахъ* слабый; *вкусъ* сначала вяжущій, а потомъ горькій.—2) Красныя хинныя корки; ихъ встрѣчается

также много сортовъ; куски плоскіе, иногда желобоватые и рѣдко трубчатые, длиною отъ 2 дюймовъ до 2 футовъ. Кожица морщинистая, сѣро-бураго цвѣта, съ лишаями; лубъ красно-бурый, отчасти волокнистый. *Запахъ* слабо-дубильный; *вкусъ* сильно-горькій, слегка вяжущій и слегка пряный.— 3) Желтыя хинныя корни собираютъ съ вѣтвей; корки трубчаты, длиною отъ $^1/_4$ до 2 фут.; кожица буро-сѣрая или пепельная, съ черными жилистыми и большими лишаями. Корковый слой темно-коричневаго цвѣта; лубъ такого же цвѣта; *запахъ* слабо-дубильный; *вкусъ* мало-вяжущій и сильно-горькій.

Х[illegible] тоническія, стягивающія свойства, и съ пользою упо[illegible]хъ болѣзняхъ, въ перемежающейся лихорадкѣ, тифѣ, неврозахъ, кахексіяхъ, потахъ, поносахъ и т. п.

## ХМѢЛЬ.

Отечество вся Европа, Сѣверная Америка; доставляетъ хмѣлевыя шишки, содержащія эѳирное масло, золото-желтую горькую смолу, камедь, лупулинъ, танинъ. Дѣйствіе хмѣля зависитъ главнымъ образомъ отъ лупулина. Хмѣль дѣйствуетъ, какъ горькое тоническое, и употребляется при золотухѣ, подагрѣ, застарѣломъ сифилисѣ.

## ХРѢНЪ.

Отечество Европа; доставляетъ корень, содержащій эѳирное, богатое сѣрою масло, бѣлокъ, крахмалъ, экстрактивное веще-



ство, горькую смолу; средство острое, раздражающее и могущее произвесть воспаленіе желудка; особенно полезенъ противъ цинги, боли желудка. Изъ выжатаго сока приготовляется очень сильный сиропъ, весьма полезный и употребляемый во Франціи, какъ средство противо-цинготное. Снаружи хрѣнъ употребляется вмѣсто катаплазмъ.

## ЦИКУТА.

Отечество Европа; доставляетъ цикутную траву, которая еще ядовитѣе болиголова и употребляется многими врачами, какъ болиголовъ.

## ЦЫТВАРНЫЙ КОРЕНЪ.

Отечество Остъ-Индія, Ява и Китай; получается отъ растенія Curcuma zedoaria. Корень плотный, узловатый, продолговатый, толщиною въ палецъ; цвѣтъ снаружи сине-сѣрый, внутри бѣлый.

*Запахъ* ароматный, похожій на камфору.

*Вкусъ* остро-ароматный, горькій.

*Употребляется*, какъ корень калгана.

## ЦЫТВАРЪ.

Отечество Востокъ, Персія, Малая Азія; доставляетъ цытварное сѣмя, содержащее особенное кристаллизующееся, весьма сильное вещество (сантонинъ), эѳирное масло, горькое экстрактивное вещество, острую зеленую бальзамную смолу, церинъ, ульминъ, соли, кали, извести. Бываетъ двухъ родовъ: левантское, лучшее, американское или африканское — худшее. Оно не есть собственно сѣмя, но нераспустившіеся цвѣтки яичной формы, цвѣта желтовато-зеленаго.

*Запахъ*, особый, непріятный.

*Вкусъ* также непріятный, горько-пряный.

*Составляетъ* превосходное противо-глистное средство, часто употребляемое.

## ЧЕМЕРИЦА.

Отечество Средняя и Южная Европа, Альпы; доставляетъ корень, содержащій эѳирное масло, острое, жирное масло, горькое экстрактивное вещество, темный пигментъ, летучія кислоты. Форма корня—стержень, сучковатый, вѣтвистый. Снаружи цвѣтъ буро-черный, внутри бѣловатый.

*Запахъ* слабый, непріятный.

*Вкусъ* противный, острый, раздражающій.

*Составляетъ* средство раздражающее, которое можетъ легко произвесть рвоту, поносъ; онъ имѣетъ особенное дѣйствіе на тазовые органы и потому употребляет ся въ геморроѣ и аменорреи.

## ЧЕРНОБЫЛЬНИКЪ.

Отечество Европа, Азія, Сѣверная Америка; доставляетъ, траву и корень чернобыльника, содержащіе кристаллическое, пахнущее опіумомъ, масло, гликозу, экстрактивное начало, жиръ, церинъ, смолистое красящее начало, танинъ, яблочную, сѣрную и фосфорную кислоты. Корень шаровидный, морщинистый, снаружи бурый, внутри бѣлый.

*Запахъ* землистый.

*Вкусъ* сначала слизисто-сладкій, а потомъ острый.

Трава употребляется, какъ кровегонное средство, при аменорреи. Корень весьма полезенъ при неврозахъ, у дѣтей и женщинъ, а также при падучей, Виттовой пляскѣ, судорогахъ.

## ЧЕСНОКЪ.

Отечество Южная Европа; доставляетъ чеснокъ, содержащій острое, летучее, богатое сѣрою масло, гликозу, бѣлокъ и т. д. Употребляется преимущественно въ молочномъ или водяномъ отварѣ для клистировъ при аскаридахъ.

## КОНСКІЙ ЧЕСНОКЪ, КОНСКІЙ МАІОРАНЪ.

Отечество Европа; доставляетъ траву, содержащую летучее начало, горькое вещество, дубильную кислоту; прежде употреблялась, какъ потогонное средство, теперь же снаружи, для полосканья рта и горла.

## ЧИСТЕЦЪ.

Отечество Европа, Сѣверная Азія; доставляетъ гвоздичный корень, содержащій эѳирное масло, смолу, танинъ, экстрактивное вещество, чернильно-орѣшковую кислоту, слѣды сѣры; составляетъ возбуждающее, стягивающее средство, весьма полезное при поносахъ, тифѣ, а также противъ перемежающейся лихорадки.

## ЧИСТОТѢЛЪ.

Доставляетъ экстрактъ чистотѣла. Содержитъ кислоту, хелидонинъ, желтый пигментъ. Сокъ растенія богатъ острымъ и горькимъ веществомъ. Стебель прямой, вѣтвистый; листья стебельчатые, сверху зеленые, снизу серебристо-зеленые, пушистые, цвѣтки желтые, съ пріятнымъ *запахомъ*.

*Вкусъ* горькій, жгучій.

*Дѣйствуетъ*, какъ легкое разъѣдающее средство. Экстрактъ употребляется при болѣзняхъ живота, какъ горькое разъѣдающее средство.

## ЩАВЕЛЬ.

Отечество Европа; доставляетъ щавельную соль, служащую прохлаждающимъ средствомъ.

## ЩАВЕЛЬ КОНСКІЙ.

Отечество Европа, Сибирь, Сѣверная Америка; доставляетъ корень, содержащій лапатинъ, дубильное начало, бѣлокъ, амиль, соли; употребляется противъ хроническихъ, накожныхъ сыпей, особенно чесоточнаго свойства.

## ШАЛФЕЙ.

Отечество Европа; доставляетъ шалфейную траву. Кустарникъ вышиною въ полтора фута; стебель вѣтвистый, бѣлый, волосатый; листья противоположные, ланцето-образные, тупые, мелко-зубчатые; цвѣтъ ихъ сѣровато-зеленоватый; цвѣтки фіолетовые, расположенные въ видѣ колоса.

*Запахъ* свѣжей травы сильно-ароматный, нѣсколько камфорный.

*Вкусъ* горьковато-ароматный, слабо-вяжущій.

*Употребляется*, какъ возбуждающее сильный потъ, а снаружи какъ стягивающее полосканье для рта и горла; богатъ эѳирнымъ масломъ и экстрактивнымъ началомъ. Настой употребляется большею частію тепловатый.

## ШАНДРА, КОНСКАЯ МЯТА.

Отечество Европа, Средняя Азія, Сѣверная Америка; доставляетъ траву, которая содержитъ эѳирное масло, горькое экстрактивное вещество, соли; составляетъ легкое горькое возбуждащее средство, которое употребляется при катарральныхъ пораженіяхъ.

## ШАФРАНЪ.

Отечество Востокъ, Южная Европа; доставляетъ шафранъ. Лучшіе сорта восточный и австрійскій. Содержитъ эѳирное масло, шафранную желть, гумми, растительный бѣлокъ. Шафранъ есть высушенныя тычники растенія Crocus satiuus, съ мелкими зазубринками и утолщеніями къ верхнему концу. Цвѣтъ темно-оранжевый, у основанія желтоватый.

*Запахъ* ароматный, особенный, шафранный.

*Вкусъ* горько-пряный.

Въ небольщихъ пріемахъ *дѣйствуетъ*, какъ средство противоспазматическое и укрѣпляющее желудокъ. Въ большихъ пріемахъ дѣйствуетъ, какъ кровегонное. Шафранный сиропъ составляетъ хорошее аналептическое средство для дѣтей. Какъ средство наружное, употребляется въ видѣ катаплазмъ противъ воспаленія грудей и шулятъ, а также противъ глазныхъ болѣзней.

## ЭЛЕМИ.

Отечество Южная и Сѣверная Америка; доставляетъ элеми,

смолистый сокъ, вытекающій изъ надрѣзовъ въ корѣ и потомъ засыхающій на воздухѣ; содержитъ двѣ смолы, эѳирное масло, горькое вещество; служитъ для приготовленія мази.

## ЯБЛОКИ.

Одинъ видъ яблокъ доставляетъ кислыя яблоки, выжатый сокъ которыхъ, вареный съ желѣзомъ, даетъ экстрактъ яблочно-кислаго желѣза.

## ЯЛАППА.

Отечество Мехика; доставляетъ ялаппный корень, содержащій смолу, крахмалъ, экстрактивное вещество, камедь, пигментъ, и т. д. Корень имѣетъ видъ круглый, шаро-образныхъ или груше-образныхъ кусковъ различной величины; снаружи цвѣтъ ихъ сѣро-бурый, внутри буро-сѣрый.

*Запахъ* непріятный.

*Вкусъ* смолистый, раздражающій.

Составляетъ весьма сильное слабительное средство.

## ЯСЕНЪ МАННЫЙ.

Отечество Вестъ-Индія, Сицилія, Калабрія; доставляетъ лучшій сортъ манны; менѣе лучшій сортъ называется калабрской манной, а самый послѣдній сортъ извѣстенъ подъ именемъ manna crassa. Манна содержитъ маннитъ, гликозу, камедь, красящее, слабящее начало; употребляется, какъ легкое слабительное, особенно для дѣтей.

## ЯЧМЕНЬ.

Доставляетъ ячменную муку. Содержитъ крахмалу 48проц., растительнаго клея около 13 проц., слизи и сахаристаго вещества почти по три съ половиной проц., незначительное количество бѣлковаго и жирнаго вещества и примѣсь нѣкоторыхъ минеральныхъ солей.

*Употребляется* для катаплазмъ. Шелушенный ячмень, даваемый въ видѣ декокта, въ воспаленіи. Наконецъ, употребляютъ ячменный солодъ для ваннъ, по 2—3 фунта на ванну.

Отечество ячменя Сицилія или Средняя Азія.

---

Часть 2-я

# ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ ОТВАРЫ ИЛИ ПИТЬЯ.

## Освѣжающіе отвары или питья.

Ихъ должно приготовлять такъ, чтобъ они были какъ можно легче и пріятнѣе. Всякое вещество,—трава или цвѣтъ,—нужныя для приготовленія питья, должны быть предварительно перебраны и очищены, т. е., освобождены отъ всякихъ постороннихъ веществъ, которыя могли бы повредить. Листья должны быть изрѣзаны какъ можно мельче,—корни тоже, одни только цвѣты остаются въ своемъ первоначальномъ состояніи.

Мы совѣтуемъ не дѣлать много питья, какъ это намъ случалось видѣть въ деревняхъ, по той причинѣ, что питье отъ долгаго стоянія теряетъ часть своего аромата и прискучаетъ больному. Прежде всего должно избѣгать отвращенія, которое неразлучно съ долгимъ употребленіемъ одного и того же питья. Приготовлять питья можно не болѣе $1/2$ — 1 фунта, смотря по времени, въ какое должно употребляться питье. Мы возьмемъ за единицу количество лекарства, полагаемое на 1 ф. Количество это каждый легко можетъ раздѣлить пополамъ.

## ПИТЬЯ, ПРИГОТОВЛЕННЫЯ ПОСРЕДСТВОМЪ РАСТВОРЕНІЯ ИЛИ РАСПУЩЕНІЯ.

### Питье изъ камеди, или камедная вода.

Камеди. . . . . . . 3 ³/₄ золотн.

Воды . . . . . . . 1 . стаканъ.

Выполоскать камедь въ холодной водѣ, распустить ее. Процѣдить чрезъ тонкое полотно и подсластить сахаромъ или медомъ.

Медовая вода (сыта) приготовляется такимъ-же образомъ.

### Питье изъ манны.

Манны . . . . . . . 16 золотн.

Воды холодной . . . . 1 стаканъ.

Дайте раствориться.

Можно на скорую руку приготовлять питья, подслащая воду какими нибудь сиропами. Преимущество подобнаго питья заключается въ томъ, что холодная вода всегда легче для желудка кипяченой воды, ибо кипяченіе лишаетъ ее воздуха, который въ ней находился.

## ПИТЬЯ, ПРИГОТОВЛЕННЫЯ И НАСТОЕННЫЯ КАКЪ ЧАЙ.

### Питье или чай изъ фіялки.

Цвѣтовъ фіялки . . . 3 ¹/₂ золотн.

Горячей воды. . . . . 1 ¹/₂ фунта.

Настаивать въ теченіе 15 минутъ, процѣдить чрезъ полотно и подсластить по вкусу.

Такъ проготовляются питья изъ цвѣтовъ.

| | |
|---|---|
| Царскаго скипетра. | Ромашки. |
| Золототысячника. | Дикаго мака. |
| Дрока. | Просвирки. |
| Донника. | Гвоздики. |
| Персиковаго цвѣта. | Иванъ-да-Марья. |
| Бузины. | Чаю. |
| Липы. | Хмѣля. |
| Проскурняка. | Бѣлокопытника. |
| Каприфолія. | |

Также точно приготовляются питья изъ мягчительныхъ грудныхъ травъ.

### Питье изъ огуречной травы.

Листьевъ огуречной травы—2 большія щепоти.

Кипятку . . . . . . 1 1/2 фунта.

Настаивать въ теченіе получаса или трехъ четвертей часа, процѣдить и подсластить.

Также приготовляются питья изъ листьевъ:

| | |
|---|---|
| Чернобыльника. | Полыни. |
| Огуречной травы. | Волосатика. |
| Чертополоха. | Цикорія. |
| Наперстянки. | Дубровки. |
| Иссопа. | Лаванды. |
| Будры. | Мелиссы (медовки). |
| Мяты. | Пролѣски. |
| Псинки. | Померанца. |
| Розмарина. | Руты. |

| | |
|---|---|
| Мыльнянки. | Шалфея. |
| Скабіозы. | Бородской травы. |
| Тмина. | Александрійскаго листа. |
| Грыжной травы. | Вероники. |

## Питье изъ стеблей.

Питья изъ стеблей приготовляются такъ же, какъ изъ листьевъ.

## Питье изъ корня репейника.

Репейнаго корня . . . 6 $^1/_2$ золотн.

Кипятку . . . . . 1 $^1/_2$ фунта.

Настаивать въ теченіе 2 часовъ, подсластить и употреблять.

Такъ точно приготовляются питья изъ корней.

| | |
|---|---|
| Лапушника. | Ангелики (дягиля) |
| Спаржи. | Водорослей. |
| Змѣевика. | Цикорія. |
| Сальнаго корня. | Папоротника. |
| Земляники. | Горечавки. |
| Просвирки. | Ира. |
| Конскаго щавеля. | Хрѣна. |
| Мыльнянки. | |

Также настаиваются и корки слѣдующихъ растеній.

Хины, горькой квассіи, бузины (второй слой коры). Подобнымъ же образомъ, только въ меньшемъ количествѣ по-

лагаемаго, т. е., 2 щепотки корня, приготовляютъ питье изъ корней истода, квассіи, сассафраса, валеріаны, акаціи, катеху и еловыхъ побѣговъ.

## ПИТЬЕ, ПРИГОТОВЛЕННОЕ ПОСРЕДСТВОМЪ ХОЛОДНАГО НАСТАИВАНЬЯ.

### Питье изъ горькой квассіи.

Квассіи горькой . . . . . . $1\frac{1}{2}$ золотника.

Воды холодной . . . . . . $\frac{3}{4}$ фунта.

Настаивать въ теченіи 10—12 часовъ, подсластить и употреблять.

Также можно сдѣлать питье изъ корней горечавки и сальнаго корня.

## ПИТЬЕ, ПРИГОТОВЛЕННОЕ ПОСРЕДСТВОМЪ ОТВАРА.

Приготовляютъ посредствомъ отвара питья изъ

| | |
|---|---|
| Бадьяна. | Репейника. |
| Корицы. | Полеваго тмина. |
| Коріандра. | Сальнаго корня. |
| Укропа. | Корсиканскаго моха. |
| Маковыхъ головокъ. | Истода. |
| Хрѣна. | Хины. |
| Слабительн. корней. | Ратанги. |
| Солодки. | Сассапарели. |
| Мыльнянки. | Сассафраса. |
| Змѣевика. | Квассіи. |
| Валеріаны | |

## ПИТЬЕ ПРИГОТОВЛЕННОЕ ПОСРЕДСТВОМЪ ДЕКОКТА.

### Питье изъ чернослива.

Чернослива. . . . . . . . одну горсть.

Воды. . . . . . . . . . полтора фунта.

Вынуть косточки и сварить мякоть; послѣ часоваго кипѣнья, процѣдить чрезъ сито.

Подобнымъ же образомъ и въ той же пропорціи приготовляются питья изъ

| | |
|---|---|
| Вишни (стебельковъ). | Дубовой корки. |
| Палечн. трав. (½ горс.) | Айвы. |
| Финиковъ. | Крахмала. |
| Винныхъ ягодъ. | Грудныхъ ягодъ. |
| Баккаута. | Гранатъ. |
| Придорожной иглы. | Латука. |
| Щавеля. | Яблокъ. |
| Винограда. | Бузины (корки). |

### Питье изъ риса.

Рису. . . . . . . . . . . 5 золот.

Воды. . . . . . . . . . сколько угодно.

Сварить рисъ въ водѣ (неменьше 1 ф.), и, когда онъ разварится, процѣдивъ, подсластить и употреблять.

Точно также дѣлаютъ питье изъ ячменя и крупы.

## ПИТЬЯ СОСТАВНЫЯ.

Такія, которыя приготовляются изъ нѣсколькихъ растеній или веществъ. Эти питья называются по ихъ дѣйствію и по специально-цѣлительному свойству. Такъ называется пекторальнымъ (груднымъ) питьемъ питье, составленное изъ грудныхъ растеній или веществъ или иначе спецій, а именно: изъ листьевъ волосатика, вероники, иссопа и будры.

Питьемъ противу кашля, называется питье, составленное изъ спецій, употребляемыхъ противъ кашля, какъ-то: цвѣтовъ просвирки, кошачьей лапки, бѣлокопытника и лепестковъ дикаго мака.

Горькія спецiи составляются изъ сухихъ листьевъ дубровки, верхушекъ золототысячника, вершинокъ полыни.

Вяжущія спецiи состоятъ изъ сухихъ корней: укропа, дикаго терна, дикой петрушки и огородной петрушки.

Спецiи ароматическія, имѣющія возбуждающія свойства, составляются изъ сухихъ листьевъ шалфея, тмина, богородской травы, иссопа, мяты, маіорана и полыни.

Вѣтрогонныя спецiи, т. е., употребляющіяся для успокоенія желудочныхъ болей, болей кишечныхъ, причиняемыхъ вѣтрами (пученьемъ), составляютъ изъ сѣменъ полеваго тмина, коріандра, аниса и укропа. Горсти этихъ спецій достаточно на чашку горячей воды; настаиванье продолжается пять минутъ; это питье можетъ быть приготовлено въ минуту и въ небольшомъ количествѣ.

Специи мягчительныя составляются изъ листьевъ просвирки, проскурняка, царскаго скипетра и простаго крестовника.

Плоды, противъ кашля употребляемыя, суть: финики, винныя ягоды, грудныя ягоды, айва.

Специи потогонныя состоятъ изъ тертаго баккаута, корней сассапарели и оспеннаго корня. Еще можно составить потогонную специю изъ огуречной травы, бузины и померанцевыхъ листьевъ.

Глистогонныя специи, употребляемыя для изгнанія глистовъ, составляются изъ листьевъ и цвѣтовъ дикой рябины, полыни и ромашки.

Исландскій мохъ приготовляется холоднымъ настаиваньемъ, когда требуется какъ мягчащее, противу кашля употребляемое средство; но его чаще употребляютъ другимъ образомъ, и, сливая первую налитую воду, поступаютъ слѣдующимъ образомъ.

Моха. . . . . . . . три съ половиною золот.

Кипятку . . . . . . . . . . полтора фунта.

Налить мохъ фунтомъ горячей воды и дать стоять 1 часъ, слить эту воду, налить полтора фунта свѣжей воды и варить въ ней мохъ въ теченіи 2 часовъ, такъ чтобы жидкости остался 1 фунтъ; процѣдить.

## ПИТЬЯ МЯГЧИТЕЛЬНЫЯ ИЛИ ГРУДНЫЯ.

Можно растворить въ достаточномъ количествѣ горячей воды камеднаго сиропа, сиропа изъ волосатика и фіялокъ;

или распустить гумми-арабикъ, или медъ въ теплой водѣ, и употреблять.

Можно также сдѣлать питье изъ фіялковыхъ цвѣтовъ, или изъ цвѣтовъ грудныхъ специй, декоктъ изъ грудныхъ ягодъ или финиковъ, отваръ истода и т. д., отыскивая по роду болѣзни подходящее питье и приготовляя его по указанію.

## ПИТЬЯ ПРОТИВУСПАЗМАТИЧЕСКІЯ.

Самое обыкновенное изъ этихъ питей есть чай изъ липоваго цвѣта, или изъ померанцевыхъ листьевъ, или изъ валеріаны.

## ПИТЬЯ УСПОКОИТЕЛЬНЫЯ.

Эти питья заключаются въ настоѣ дикаго мака, латука, въ декоктѣ изъ маковыхъ головокъ.

Можно также положить нѣсколько капель, отъ 9 до 10, лавдана на стаканъ сахарной воды и пить по дессертной ложкѣ.

## ПИТЬЯ ВЯЖУЩІЯ.

Лимонадъ, оржадъ, приготовляемые холоднымъ настаиваньемъ, служатъ превосходнымъ вяжущимъ средствомъ.

Можно также употреблять настой смолистаго сока акаціи катеху, рисовый отваръ, отваръ сальнаго корня, который можно подсластить вяжущимъ сиропомъ, какъ напр., сиро-

помъ изъ ратанги, айвы, или рябины, или настоемъ изъ гусиной травы, изъ листьевъ ежевики.

## ПИТЬЯ ПОСЛАБЛЯЮЩІЯ.

Между ними мы помѣстимъ подслащенное медомъ молоко, декоктъ изъ меда, изъ цикорія, подслащенный медомъ; декоктъ изъ чернослива, настой цикорный, изъ александрійскаго листа, изъ персиковыхъ цвѣтовъ.

## ПИТЬЯ ТОНИЧЕСКІЯ.

Они состоятъ изъ настоя тысячелистника, дубровки, хмѣля, изъ холодныхъ настоевъ горечавки, хины, горькой квассіи, изъ декокта моховаго, и т. п. Можно подслащать эти питья сахаромъ, хрѣновымъ сиропомъ, сиропомъ горько-померанцевой корки, сиропомъ хиннымъ, и т. д. Питья съ виномъ, бульономъ и кофе, суть превосходныя тоническія питья.

## ПИТЬЯ ВОЗБУЖДАЮЩІЯ.

Эта суть настои чая, ромашки, полыни, иссопа, бѣлокопытника, медовки, мяты, шалфея, серполета, богородской травы; также настой изъ еловыхъ побѣговъ или почекъ, хрѣна, и т. д. Эти питья употребляются теплыми, достаточно подслащенными, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ къ нимъ прибавляется немного вина, спирта или водки. Горячій пуншъ также составляетъ превосходное возбуждающее средство; хорошо также дѣйствуетъ въ этомъ случаѣ и подогрѣтое вино.

## ПИТЬЯ МОЧЕГОННЫЯ.

Все, что гонитъ мочу, есть мочегонное лекарство. Вода есть лучшее изъ мочегонныхъ средствъ; можно прибавлять въ нее бѣлаго вина, равно и пиво можно смѣшивать съ водою. Самымъ употребительнымъ изъ мочегонныхъ питей есть настой палечной травы, настой изъ стебельковъ вишень, спаржи, настои: огуречной травы, первоцвѣта, дрока, лабазника, стѣнницы, къ которымъ прибавляютъ двууглекислаго поташа. Питья эти подслащаются сахарнымъ пескомъ, медомъ или сиропомъ изъ спаржевыхъ стрѣлокъ.

## ПИТЬЯ ПОТОГОННЫЯ.

Всѣ горячія питья могутъ служить потогонными средствами. Самыя общеупотребительныя изъ нихъ суть: настой изъ огуречной травы, скабіозы, цвѣтовъ бузины, и т. д.; настои изъ конскаго щавеля или мыльнянки, отвары сассапарели, сассафраса, репейника, змѣевика.

## ПИТЬЯ ОСВѢЖАЮЩІЯ.

Эти питья большею частію холодныя, слегка кисловатыя, съ нѣсколькими каплями уксуса, лимоннаго, померанцеваго или винограднаго сока. Въ число ихъ входитъ вода съ виномъ, лимонадъ, оранжадъ. Самый лучшій лимонадъ приготовляется настаиваньемъ разрѣзаннаго на куски лимона въ

холодной водѣ; трехъ ломтиковъ лимона достаточно на $^1/_2$ ф. воды.

Употребляютъ также съ водой ягодные морсы, какъ то: смородинный, малиновый, вишневый, барбарисный, клюквенный, брусничный, и т. д. Обыкновенно ихъ подслащаютъ весьма немного. Самыя лучшія прохладительныя питья приготовляются холодными, потому чтобы вода не потеряла отъ кипѣнья воздуха, который въ ней заключается.

## ПИТЬЯ ПРОТИВОГЛИСТНЫЯ.

Обыкновенно докторъ прописываетъ этого рода питья. Они состоятъ изъ настоевъ полыни, чернобыльника, дикой рябяны, какъ наиболѣе общеупотребительныхъ. Но эти питья только предназначаются для усиленья дѣйствій спеціальнаго лекарства, прописаннаго врачемъ.

## ПИТЬЯ ПРОТИВОЗОЛОТУШНЫЯ.

Обыкновенно приписываютъ противозолотушное свойство веществамъ, вовсе необладающимъ ими. Между растеніями лучшія изъ нихъ противозолотушныя суть: тоническія, горькія, возбуждающія. Къ нимъ должно прибавить еще настой изъ листьевъ орѣшины грецкой, хрѣна, сладко-горькаго паслена, и т. д.

# СОКИ И СИРОПЫ.

## СОКИ.

Подъ именемъ водянистыхъ соковъ разумѣется водянистый сокъ, выжимаемый изъ листьевъ, стеблей растенія.

### Сокъ изъ цикорія.

Свѣжихъ листьевъ цикорія—сколько нужно.

Истолочь листья въ ступкѣ, выжать сокъ, освѣтлить его, пропустивъ чрезъ фильтровальную бумагу или тонкое полотно.

Когда же растенія содержатъ очень слизистый сокъ, или, если растеніе не очень сочно,—ихъ толкутъ и прибавляютъ девятую часть ихъ вѣса воды для разведенія сока.

Такъ приготовляются соки всѣхъ свѣжихъ растеній.

Два съ половиною фунта нижеслѣдующихъ растеній даютъ обыкновенно почти 2 ф. сока:

| | |
|---|---|
| Огуречная трава. | Каприфолій. |
| Цикорій. | Крессъ-салатъ. |
| Дымянка. | Латукъ. |
| Щавель. | Шпинатъ. |
| Одуванчикъ. | Мыльнянка. |

### Очистительный сокъ изъ травы.

Взять листьевъ цикорія, дымянки, огуречной травы по равной части.

Истолочь, выжать и процѣдить. Сокъ этотъ приготовляется вечеромъ; его процѣживаютъ чрезъ фильтръ, гдѣ онъ медленно стекаетъ во всю ночь; утромъ его пьютъ отъ $^1/_2$ до 1 стакана.

Приготовляются также изъ плодовъ и ягодъ соки кислые или морсы.

## ПРИГОТОВЛЕНІЕ СИРОПОВЪ.

Сиропы приготовляются различными способами: 1) посредствомъ растворенія въ холодной водѣ и процѣживанья чрезъ фильтръ; 2) посредствомъ растворенія въ горячей водѣ, освѣтленія и фильтрованья.

### Сиропъ простой.

Простымъ сиропомъ называется сиропъ изъ одного сахара.

Сахара самаго лучшаго . . . . 3 ф.
Чистой воды. . . . . . . . 2 —

Распустить сахаръ въ холодной водѣ, оставить въ покоѣ на 12 часовъ, процѣдить и пропустить чрезъ фильтръ.

## СИРОПЫ СОСТАВНЫЕ.

Можно составлять сложные сиропы изъ соковъ и экстрактовъ.

### Сиропъ изъ гумми-арабика.

Гумми-арабика . . . . 28 золотн.
Холодной воды . . . . 28 —

Распустить гумми-арабикъ, мѣшая время отъ времени; процѣдить и смѣшать ее съ 2 ф. сиропа простаго, кипящаго; или сварить прямо камедь съ двойнымъ количествомъ сахара.

### Сиропъ изъ фіялковыхъ цвѣтовъ.

Свѣжихъ фіялковыхъ цвѣтовъ. . . 10 золотн.
Кипятку . . . . . . . . . . ¼ ф.

Настаивать цвѣты въ продолженіи 12 часовъ, процѣдить настой чрезъ полотно, дать отстояться; положить двойное противъ настоя количество сахара и дайте ему распуститься, поставя сиропъ въ водяную баню.

Такимъ же образомъ приготовляются сиропы изъ слѣдующихъ цвѣтовъ:

| | |
|---|---|
| Ромашки. | Каприфолія. |
| Дикаго мака. | Просвирки. |
| Гвоздики. | Бѣлокопытника. |

Или, лучше сказать, всѣ сиропы соотвѣтствуютъ вышеописаннымъ питьямъ.

Но какъ не всегда можно имѣть свѣжіе цвѣты, то можно приготовлять изъ сухихъ цвѣтовъ сиропы слѣдующимъ образомъ:

Сухихъ цвѣтовъ бѣлокопытника 1 горсть и горячей воды полфунта. . . . . . .

Настаивать въ продолженіе 5 часовъ, положить въ настой половину яичнаго бѣлка, прибавить 3 ф. сахару, вскипятить и процѣдить.

### Сиропъ изъ Иванъ-да-Марья.

Сухихъ цвѣтовъ. . . . . . 7 золотн.

Кипятку . . . . . . . . . 28 —

Настаивать 4—5 часовъ, процѣдить и прибавить двойное противъ жидкости количество сахара.

Сиропъ съ настоемъ изъ листьевъ и стеблей приготовляется точно такъ же, какъ изъ растеній:

Иссопа, медовки, будры, мяты.

### Сиропъ мочегонный изъ 5 корней.

Кипятку ½ чашки; сухихъ корней репейника, укропа, петрушки, спаржи, иглицы, по 3 щепотки каждаго или около 5 золотниковъ. Истолочь корни или искрошить, сдѣлать изъ нихъ настой, процѣдить, вторично, настоять двойнымъ количествомъ воды; прокипятить жидкость, смѣшать съ двойнымъ количествомъ простаго сиропа.

Можно приготовлять сиропы: возбуждающіе, мягчительные, и т. д., прибавляя къ настою изъ этихъ специй двойное количество сахара.

### Сиропъ изъ горечавки.

Корня горечавки. . . . . 14 золотн.

Кипятку . . . . . . . ¾ фунта.

Настаивать въ теченіе 2 часовъ, процѣдить, прибавить двойное количество сахара, и распустить въ водяной капели.

Такъ приготовляются почти всѣ сиропы изъ корней слѣдующихъ растеній: проскурняка, репейника, дягиля, змѣевика, и проч.

### Сиропъ изъ дымянки.

| | |
|---|---|
| Соку дымянки. . . | 1 ф. 44 золотн. |
| Бѣлаго сахару . . | 1 ф. 44 золотн. |

Смѣшать и сварить надлежащей густоты сиропъ. Также приготовляются слѣдующіе сиропы:

| | |
|---|---|
| Цикорія. | Иглицы. |
| Крапивы. | Щавеля. |
| Медовки. | Дикой розы. |
| Водянаго трилистника. | |

Если же по времени года нельзя найти свѣжихъ цвѣтовъ, то можно поступить слѣдующимъ образомъ.

| | |
|---|---|
| Растеній . . . . . . | 70 золотн. |
| Воды . . . . . . | три чет. ф. |

Вскипятить и на извѣстное количество процѣженной жидкости положить вдвое больше сахара. Сиропъ этотъ или слегка кипятятъ, или пропускаютъ сквозь фильтръ.

### Сиропъ изъ спаржевыхъ головокъ.

| | |
|---|---|
| Соку изъ головокъ. . . . . | 70 золот. |
| Сахару . . . . . . . | 1 ф. 44 золот. |

Распустить въ водяной капели.

Также приготовляется сиропъ изъ:

| | |
|---|---|
| Красной капусты. | Омега. |
| Ложечной травы. | Крессъ-салата. |
| Стѣнницы. | Персиковыхъ цвѣтовъ. |

### Сиропъ изъ хины.

Сѣрой хины . . . . . 14 золотн.
Воды . . . . . . . три чет. фунта.

Кипятить въ теченіе 1 часа, процѣдить, дать жидкости испариться на половину; прибавить сахару, сварить до густоты сиропа и пропустить сквозь фильтръ.

## ЛЕКАРСТВЕННЫЯ ВИНА.

Это суть вина, настоенныя однимъ или нѣсколькими лекарственными веществами.

### Вино изъ горечавки.

Корня горечавки . . . . 7 золот.
Спирта . . . . . . . . 14 золот.

Изрѣзать корень кусочками, налить спиртомъ или 23 золотниками водки. Прибавить 1 ф. краснаго вина и настаивать 9 дней въ закупоренной посудѣ; дать отстояться и процѣдить чрезъ фильтръ.

Настойка эта въ большомъ употребленіи, какъ тоническое средство.

### Хинное вино.

Хины сѣрой или желтой толченой $17\frac{1}{2}$ золот.

Алкоголя. . . . . . . 1 чет. фунта.

или водки . . . . . . 56 золотн.

Поступать, какъ сказано о винѣ изъ горечавки. Употребляется, какъ тоническое и противо-лихорадочное средство.

### Полынная настойка.

Полыни . . . . . . . . 14 золот.

Спирта. . . . . . . . . 14 золот.

Настаивать 2 дня, процѣдить. Употребляется, какъ средство тоническое, возбуждающее.

Также приготовляются настойки изъ наперстянки, дубровки, валеріаны, горькой квассіи.

### Вино противоцынготное.

Хрѣноваго корня. . . . . 7 золотн.

Листьевъ крессъ-салата. . . . $3\frac{3}{4}$ золотн.

ложечной травы. . . . $3\frac{3}{4}$ золотн.

мяты. . . . . . . . . . $3\frac{3}{4}$ золотн.

Настаивать въ продоженіи 9 дней въ 1 фунтѣ вина; процѣдить.

Эта настойка очень употребительна во всѣхъ золотушныхъ болѣзняхъ, въ количествѣ 2—4 чайныхъ ложекъ на пріемъ раза 2 въ день.

### Настойка мочегонная.

Можжевеловыхъ ягодъ . . 14 золот.
Листьевъ наперстянки . . 3 съ пол. золот.
Морскаго луку . . . . . полтора золотн.

Настаивать 2 дня въ бутылкѣ бѣлаго вина, прибавить уксуснокислой поташной соли и процѣдить чрезъ фильтръ. Употребляютъ по 2 столовыхъ ложки въ день.

### Ароматическое вино.

Ароматическихъ специй . . семь золотн.
Краснаго вина . . . . . . три чет. фунта.

Настаивать 9 дней и процѣдить. Употребляется при заживленіи злокачественныхъ язвъ.

## ПИТЬЯ ИЛИ НАПИТКИ ЛЕКАРСТВЕННЫЯ.

### Грудное питье.

Сладкаго миндаля 4 золотника истолочь, прибавляя понемногу сахара и воды до тѣхъ поръ, пока не сдѣлается мягкое тѣсто, въ которое прибавить постепенно 1 золотникъ камеди, еще воды и сахара и ложечку померанцевой воды. Количество сахара и воды слѣдующее: сахару 6 золотн., воды 24 золотн., получится питья 1 унція.

### Питье противъ нервныхъ припадковъ.

Стаканъ сахарной воды смѣшать съ чайною ложкой померанцевой воды и 10—15 каплями эѳира; получится противо-

спазматическое питье, которое принимать по 1 ложкѣ чрезъ полчаса.

## Питье успокоительное.

Настой изъ липоваго цвѣта или померанцевыхъ цвѣтовъ подсластить по вкусу и прибавить 10—15 капель лавдана. Это составитъ превосходное успокоительное питье при воспаленіи дыхательныхъ вѣтвей, изнурительныхъ кашляхъ, судорогахъ желудка, коликахъ, и т. д.

## Питье противъ рвоты и тошноты.

За неимѣніемъ зелтерской воды или сыворотки, положить въ стаканъ холодной воды ½ ложки углекислой соды, прибавить немного уксусу или лимоннаго сока; углекислота отдѣлится, и получится очень вкусное питье. Сахару прибавляютъ по вкусу больнаго, который долженъ выпить питье во время отдѣленія углекислоты, т. е. во время шипѣнья.

## Слабительное питье.

Это лекарство иногда помогаетъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ другія слабительныя не оказали ни малѣйшаго дѣйствія.

Толченыхъ корней просвирки. . . . 5 золотн.

Корней конскаго щавеля . . . . . »

— палечной травы . . . . . . »

Солодки. . . . . . . . . . »

Листьевъ цикорія . . . . . . . . »

Кипятить 10 минутъ въ 3 бутылкахъ воды, прибавить александрійскаго листа 7 золотн., ревяня 1 золотн., сѣрнокислой соды 1 золотникъ. Настаивать 2 часа и процѣдить. Пить утромъ 2, 3 дня сряду, до дѣйствія.

## ПРОМЫВАТЕЛЬНЫЯ.

## МЯГЧИТЕЛЬНЫЯ ПРОМЫВАТЕЛЬНЫЯ.

Они заключаются въ отрубномъ отварѣ, жидко сваренномъ картофельномъ крахмалѣ, въ декоктѣ изъ льнянаго сѣмени, изъ листьевъ просвирки, изъ корней проскурняка.

### Промывательное изъ отрубной воды.

Отрубей. . . . . . одну большую горсть

Воды . . . . . . . три четверти фунта.

Вскипятить въ теченіе нѣсколькихъ минутъ и процѣдить.

### Промывательное изъ крахмала.

Крахмала. . . . . . . . одна столов. ложка.

Холодной воды . . . . . . один большой стаканъ.

Разболтать крахмалъ въ холодной водѣ, заварить двумя стаканами кипятку изъ самовара и хорошенько размѣшать.

### Промывательное изъ льнянаго сѣмени.

Льнянаго сѣмени . . . . . . . . одна столов. ложка.

Воды. . . . . . . . . . . . три четверти фунта.

Кипятить въ теченіе 15 минутъ и процѣдить.

Можно приготовить льняное сѣмя иначе, настаивая въ горячей водѣ три четверти—1 часъ. Также приготовляется промывательное изъ корня проскурняка, 7 золотн. корня на три четверти ф. воды.

### Промывательное съ мягчительными специями.

Взять мягчительпыхъ специй, кипятить 15 минутъ, наливъ полуфунтомъ воды; процѣдить.

Можно приготовлять такимъ образомъ промывательное изъ студня (5 золотн. студня и три четверти ф. воды), изъ крупы, ячменя, и т. д. Два послѣднія промывательныя приготовляются какъ промывательное изъ проскурника (7 золотн.); иногда въ нихъ прибавляютъ кипяченаго молока.

## ПРОМЫВАТЕЛЬН. ПРОТИВОСПАЗМАТИЧЕСКІЯ.

Это промывательныя изъ вонючки, камфоры, липоваго цвѣта и валеріаны.

### Промывательное изъ вонючки.

Вонючки. . . . . . . . . 2 золотника.
Декокта проскурняка . . . . . полфунта
Процѣдить

### Промывательное съ камфорой.

Камфоры. . . . . . . . . 1 золотникъ

Размѣшать съ яичнымъ желткомъ и прибавить декокта изъ просвирняка три четверти фунта.

Можно уменьшить на половину количество камфоры.

### Промывательное изъ валеріаны.

Корня валеріаны . . . . . . двѣ большихъ горсти.

Настаивать 15 минутъ въ полуфунтѣ воды и процѣдить.

## ПРОМЫВАТЕЛЬНЫЯ УСПОКОИТЕЛЬНЫЯ.

Они служатъ въ тоже время противоспазматическими. Послѣднія отличаются тѣмъ, что бываютъ назначаемы спеціально тогда, когда хотятъ воспрепятствовать развитію общаго нервнаго разстройства.

### Промывательное изъ маковыхъ головокъ.

Маковыхъ головокъ. . . . . . . 1—2 штуки

Простой воды или варенаго крахмала полтора фунта.

Истереть маковыя головки, вскипятить, дать отстояться и процѣдить.

Это промывательное употребляется 1—2 раза пополуфунту, черезъ часъ одинъ послѣ другаго. Передъ подобнымъ клистиромъ должно поставить простой.

### Промывательное съ лавданомъ.

Оно очень сильно и можетъ быть очень скоро приготовлено. Достаточно положить въ настой (теплый или холодный) проскурняка 10—15—20 капель сиденгамскаго лавдана.

### Промывательное изъ дикаго мака, изъ псинки.

Она состоитъ изъ декокта или просто настоя псинки, или дикаго мака.

## ПРОМЫВАТЕЛЬНЫЯ ВЯЖУЩІЯ.

Они употребляются, чтобы остановить внутреннее кровотеченіе или хроническій упорный поносъ.

### Промывательное изъ змѣевика, сложное.

Змѣевика. . . . . . . три золотн.
Красныхъ розъ . . . . . » золотн.

Настаивать полчаса въ четверти фунта горячей воды, процѣдить и остудить.

Также точно готовится клистиръ изъ сальнаго корня.

### Промывательное изъ катеху.

Истолочь щепоть акаціи катеху, настоять въ горячей водѣ (полфунта), остудить и процѣдить.

Также приготовляются промывательныя изъ ратанги, одноцвѣта, корня коломбо.

### Промывательное изъ танина.

Танина. . . . . . . отъ $^1/_3$ до половины золотн.
Воды. . . . . . . полфунта.

Настаивать въ холодной водѣ.

Также приготовляется промывательное изъ квасцовъ.

### Промывательное изъ дубовой корки.

Дубовой корки.. . . . . . одну небольш. горсть.

Воды.. . . . . . . . . полфунта.

Вскипятить, остудить и процѣдить.

Также приготовляютъ клистиръ изъ айвы, рябины и плодовъ шиповника.

## ПРОМЫВАТЕЛЬНЫЯ СЛАБИТЕЛЬНЫЯ.

### Промывательное изъ цикорія.

Цикорія . . . . . . . . одну горсть.

Воды. . . . . . . . . полфунта.

Прокипятивъ, процѣдить. Можно прибавить ложку меда или сахарнаго песку или сахарной патоки.

Также приготовляются клистиры изъ вьюнка, пролѣски, чернослива, пырея, тамаринда. Пролѣски берется небольшое количество.

### Промывательное изъ александрійскаго листа.

Александрійскаго листа. . . . . двѣ щепоти.

Воды . . . . . . . . . . . полфунта.

Настаивать 3 часа, процѣдить. Можно приготовлять его на молокѣ или на просвирковой водѣ, или же на водѣ изъ

отрубей.—Промывательное изъ александрійскаго листа тѣмъ неудобно, что причиняетъ колики; приготовленное холоднымъ путемъ, оно производитъ ихъ рѣже.

### Промывательное изъ мыла.

Простаго мыла. . , . . . . : . три золотн.

Воды . . . . . . . . . . . . полфунта.

Распустить въ горячей водѣ.

### Маслянистое промывательное.

Прованскаго масла. . . . . , . 3—4 чайн. ложки

Сбить съ яичнымъ желткомъ и развесть полфунта теплой воды, или воды изъ отрубей, или просвирковаго отвара.

Это промывательное очень удобно и дѣйствительно.

### Соленое промывательное.

Поваренной соли. . . . . . . . 1—2 ложечки.

Воды . . . . . . . . . . . . 32 золотника.

Распустить соль. Это промывательное замѣняетъ углекислую соду или углекислую магнезію.

### Промывательное изъ сабура.

Сабура. . . . . . . . . три золотн.

Теплой воды . . . . . . . полфунта.

Распустить сабуръ въ водѣ. Это промывательное хорошо дѣйствуетъ.

## ПРОМЫВАТЕЛЬНЫЯ ТОНИЧЕСКІЯ.

Назначаются, когда хотятъ укрѣпить изнуренныя силы.

### Промывательное изъ хины.

Толченой хины. . . . . . . три золотн.
Воды. . . . . . . . . . . полфунта
Кипятить полчаса и процѣдить.

### Промывательное изъ вина.

Стаканъ стараго бордосскаго вина развесть такимъ же количествомъ воды или бульона и употреблять. Это промывательное должно по дольше оставаться въ кишкахъ.

## ПРОМЫВАТЕЛЬНЫЯ ГЛИСТОГОННЫЯ.

Они весьма многочисленны и очень дѣйствительны.

### Промывательное изъ цытварнаго сѣмени.

Цытварнаго сѣмени (въ порошкѣ) половина стол. ложки.
Кипятку. . . . . . . . . одинъ стаканъ.
Настаивать полчаса и процѣдить.

Можно также приготовлять промывательное изъ корсиканскаго моха, полыни, чернобыльника, и т. п.

Камфорное промывательное отлично убиваетъ глистъ.

—

# ПРИМОЧКИ.

## ПРИМОЧКИ МЯГЧИТЕЛЬНЫЯ.

### Изъ льнянаго сѣмени.

Льнянаго сѣмени . . . . одна стол. ложка.

Воды . . . . . . . три четверти фунта.

Кипятить въ теченіе 20 минутъ, взболтать слегка, дать отстояться, процѣдить и употреблять.

### Изъ мягчительныхъ specій.

Мягчительныхъ спецій. . . . одна небольш. горсть.

Воды. . . . . . . . . полфунта.

Прокипятить и процѣдить.

### Изъ мягчительныхъ корней.

Корня просвирки . . . одна больш. горсть.

Льнянаго сѣмени . . . половина стол. ложки.

Воды. . . . . . . . полфунта.

Кипятить въ теченіе 20 минутъ и процѣдить.

## УСПОКОИТЕЛЬНЫЯ ПРИМОЧКИ.

### Изъ маковыхъ головокъ.

Маку . . . . . . . . три или чет. головки.

Воды . . . . . . . . полфунта.

Искрошить мелко головки и кипятить, пока не выпрѣетъ до одной трети.

Можно прибавлять немного льнянаго сѣмени; въ такомъ случаѣ эта припарка будетъ мягчительно-успокоительная.

Можно также въ примочку изъ льнянаго сѣмени прибавить сиденгамскаго лавдана.

### Изъ успокоительныхъ средствъ.

Листьевъ бѣлены. . . . . одна горсть.

Сонной одури, или псинки. . одна горсть.

Воды . . . . . . . . полфунта.

Кипятить въ теченіе 20 минутъ и процѣдить.

### Изъ листьевъ псинки.

Листьевъ псинки . . . . . двѣнадцать золот.

Корня просвирки . . . . . десять золот.

Воды. . . . . . . . . три четв. фунта.

Кипятить въ теченіи 20 минутъ и процѣдить.

## ПРИМОЧКИ ТОНИЧЕСКІЯ ИЛИ УКРѢПЛЯЮЩІЯ

### Изъ тоническихъ специй.

Взять по небольшой горсти ароматическихъ травъ, (шалфею, лаванды, розмарину, и т. д.) и сварить въ полуфунтѣ воды.

### Хинная.

Хинной корки. . . . . десять золотн.

Воды . . . . . . . . три четверти фунта.

Вскипятить, дать отстояться и процѣдить.

## ПРИМОЧКА РАЗРѢШИТЕЛЬНАЯ.

### Водка камфарная.

Ее можно употреблять одну или разводить водой, или, что еще лучше, свинцовой водой.

### Вода минерально-растительная.

Свинцовой окиси или свинцоваго уксуса полов. ложки.

Воды . . . . . . три четверти фунта.

Иногда прибавляютъ простаго спирта, или камфарнаго, или же простой водки.

Можно въ одну минуту приготовить разрѣшительную примочку изъ простой водки, въ которой распущено мелко наструганное бѣлое мыло; иногда прибавляютъ поваренной соли.

Употребляютъ также примочку изъ уксуса, вина и соли, взятыхъ по равной части и смѣшанныхъ вмѣстѣ.

## ПРИМОЧКИ ВЯЖУЩІЯ.

### Изъ дубовой коры.

Дубовой коры. . . . . . . десять золотн.

Воды . . . . . . . . полтора фунта.

Кипятить и упарить на двѣ трети, остудить.

Также приготовляются примочки изъ чернильныхъ орѣховъ, корня змѣевика, провансальскихъ розъ и листьевъ орѣшины.

### Квасцовая вода.

Она составляетъ превосходную примочку. Кусокъ квасцовъ, величиною съ орѣхъ, разводятъ въ фунтѣ холодной воды.

### Примочка изъ зеленаго купороса.

Ее приготовляютъ, какъ предъидущую и употребляютъ въ подобныхъ же случаяхъ. Эта примочка тѣмъ неудобна, что очень пачкаетъ бѣлье.

Можно употреблять и чернила при тѣхъ же обстоятельствахъ, но они еще хуже отмываются отъ бѣлья, нежели купоросъ.

### Примочка изъ виноградной лозы.

Ее съ пользою употребляютъ для очищенія атоническихъ ранъ, для промыванья злокачественныхъ язвъ, и спринцеванья глубокихъ ранъ.

Взять нѣсколько стеблей виноградной лозы и сварить ихъ въ достаточномъ количествѣ воды.

—

# ПОЛОСКАНЬЯ.

## МЯГЧИТЕЛЬНЫЯ ПОЛОСКАНЬЯ.

Употребляются въ воспаленіяхъ горла, миндалевидныхъ железъ, при затруднительномъ глотаніи.

### Изъ просвирки.

Корня просвирки. . . . три или четыре щепоти.

Воды . . . . . . . . . половина бутылки.

Вскипятить, процѣдить и прибавить 2 ложки бѣлаго меду.

Если въ это полосканье положить нѣсколько маковыхъ головокъ, то получится успокоительно-мягчительное полосканье.

### Полосканье изъ винныхъ ягодъ.

Винныхъ ягодъ. . . . . . 3—4 штуки

Воды. . . . . . . . . 1 фунтъ.

Разрѣзать винныя ягоды на нѣсколько частей, сварить ихъ и процѣдить.

Можно также сдѣлать мягчительное полосканье изъ декокта льнянаго сѣмени, но запахъ такого полосканья противенъ.

## ПОЛОСКАНЬЯ ВЯЖУЩІЯ.

### Изъ квасцовъ или буры.

Квасцовъ или буры . . . . четыре золотн.

Воды ячменной или простой. . полфунта.

Распустить квасцы или буру, прибавить простаго или розоваго меду. Это одно изъ наиболѣе употребительныхъ полосканій.

## ПОЛОСКАНЬЯ РАЗРѢШАЮЩІЯ И ВОЗБУЖДАЮЩІЯ.

Употребляются въ хроническихъ жабахъ и въ завалахъ миндалевидныхъ железъ.

### Изъ горькихъ специй.

Горькихъ специй . . . . . . . одну щепоть.

Кипятку. . . . . . . . . . полфунта.

Настоять и прибавить 2—4 ложки меду.

### Шалфейное полосканье.

Шалфею. . . . . . . . . двѣ или три ложки.

Воды. . . . . . . . . . полфунта.

Настоять и подсластить медомъ.

## Хинное полосканье.

Хинной корки . . . . . . четыре золотн.

Воды . . . . . . . . полфунта.

Вскипятить, процѣдить и прибавить меду.

Ячменная вода, съ небольшимъ количествомъ водки и меду составляетъ прекрасное разрѣшающее и возбуждающее средство.

# ВАННЫ.

## ВАННЫ МЯГЧИТЕЛЬНЫЯ.

### Изъ отрубей.

Такую ванну приготовляютъ двумя способами 1) кипятятъ въ продолженіе 15—20 минутъ 4 фунта отрубей въ достаточномъ количествѣ воды, процѣживаютъ и выливаютъ въ обыкновенную ванну. 2) Завязываютъ отруби въ салфетку или мѣшокъ и опускаютъ въ ванну на нѣсколько времени, а иногда и совсѣмъ оставляютъ ихъ лежать на днѣ. Но этотъ способъ хуже предыдущаго потому, что меньше выдѣляется крахмальныхъ частицъ.

### ИЗЪ МЯГЧИТЕЛЬНЫХЪ РАСТЕНІЙ.

Приготовляется изъ листьевъ, сѣменъ или корней. Берутъ 5—10 горстей листьевъ просвирки, проскурняка, стѣнницы, царскаго скипетра, и кипятятъ часъ въ 3—4 фунтахъ воды, и выливаютъ въ ванну совсѣмъ съ листьями, или процѣдивъ сперва. Гораздо лучше выливать процѣженный настой.

Можно употреблять для ванны и корни слѣдующихъ растеній: просвирняка, сальнаго корня, проскурняка, и т. д.

Берутъ ихъ 8—9 горстей, варятъ въ 3—4-хъ фунтахъ воды въ теченіе часа, процѣживаютъ и выливаютъ въ ванну.

Для мягчительныхъ ваннъ употребляютъ также льняное сѣмя въ количествѣ 1 фунта, который варятъ въ 2 фунтахъ воды; образовавшійся клейкій декоктъ выливаютъ въ ванну. Можно смѣшать льняное сѣмя съ полуфунтомъ мягчительныхъ травъ, или съ такимъ же количествомъ проскурняковаго корня.

### Крахмальная ванна.

Она приготовляется завариваньемъ крахмала въ горячей водѣ, который потомъ выливается въ ванну. Эта ванна очень употребительна противъ нѣкоторыхъ накожныхъ, острыхъ болѣзней.

## ВАННЫ УСПОКОИТЕЛЬНЫЯ.

### Изъ псинки.

Взять 3—4 горсти листьевъ псинки, сварить въ 2—3 фунтахъ воды и вылить въ ванну.

### Изъ листьевъ омега, сонной одури.

Взять небольшую горсть листьевъ одного изъ слѣдующихъ растеній: омега, сонной одури, бѣлены, дурмана, вскипятить въ водѣ и вылить въ ванну.

Точно также для успокоительной ванны можно сварить 5—6 маковыхъ головокъ въ 1 ф. воды.

Вообще надобно замѣтить, что не должно долго оставаться въ ваннѣ изъ омега, сонной одури, бѣлены, маковыхъ головокъ.

## ВАННЫ ПРОТИВОСПАЗМАТИЧЕСКІЯ.

### Изъ валеріаны.

Эта ванна составляетъ по преимуществу противоспазматическое средство, ибо имѣетъ свойство успокоивать нервное раздраженіе, особенно у женщинъ. Для ванны берется 5—6 горстей корня валеріаны и варится въ 2 фунтахъ воды; отваръ выливается въ обыкновенную горячую ванну. Иногда въ горячую ванну просто кладется корень валеріаны; ему даютъ настояться. Запахъ валеріаны до того силенъ и непріятенъ, что немногіе рѣшаются класть этотъ корень въ ванну.

### Изъ липоваго цвѣта.

Ея употребляютъ очень часто; она приготовляется, какъ и вышеописанная, т. е., посредствомъ отдѣльнаго настаиванья 8—9 горстей липоваго цвѣта въ нѣсколькихъ фунтахъ воды, или посредствомъ опущенія липоваго цвѣта прямо въ горячую ванну, гдѣ онъ и настоится.

## ВАННЫ ТОНИЧЕСКІЯ.

### Изъ ароматическихъ травъ.

Ихъ приготовляютъ, прибавляя въ теплую воду настой изъ ароматическихъ специй (шалфея, лаванды, розмарина, и т. д.); для нѣкоторыхъ больныхъ сильный запахъ этихъ ваннъ бываетъ иногда вреденъ.

### Изъ листьевъ орѣшины.

Приготовляется, какъ и предъидущая. Подобнымъ же образомъ готовятся ванны изъ водорослей, хрѣна, ложечной травы и сѣнной трухи. Мы совѣтуемъ часто употреблять ихъ, потому что онѣ, во первыхъ, очень полезны, а во вторыхъ доступны по своей дешевизнѣ какъ городскимъ, такъ и деревенскимъ жителямъ.

### Ванны соленыя.

Чаще всего эти ванны приготовляются просто, кладя въ простую горячую ванну отъ 2 до 4 фунтовъ соли; давъ послѣдней распуститься, входятъ въ ванну. Иногда прибавляется студень, чтобъ уменьшить слишкомъ возбуждающее свойство соленой воды.

### Изъ дубовой коры, еловыхъ иголъ и сосновыхъ шишекъ.

Къ обыкновенной ваннѣ прибавляютъ декоктъ изъ вышеописанныхъ веществъ, въ количествѣ двухъ фунтовъ.

### Щелочныя ванны.

Онѣ приготовляются слѣдующимъ образомъ: распускаются отъ четверти ф., до полуфунта угле-кислой соды или поташа въ ваннѣ. Обыкновенно употребляютъ для ваннъ простую или кристаллическую соду. Сода или поташъ, распущенные въ водѣ, производятъ въ тѣлѣ зудъ, а потому лучше прибавлять ихъ къ мягчительнымъ ваннамъ изъ отрубей.

### Мыльныя ванны.

Онѣ имѣютъ почти тѣже свойства, какъ и щелочная ванна, но въ гораздо слабѣйшей степени. Мыльную ванну приготовляютъ, распуская 2 ф. бѣлаго мыла въ 2 или 3-хъ фунтахъ кипятку и вливаютъ такой растворъ въ приготовленную ванну.

### Сѣрныя ванны.

Вообще онѣ весьма употребительны, какъ превосходное тоническое средство, а еще болѣе, какъ средство специфическое противъ нѣкоторыхъ накожныхъ болѣзней. Ихъ приготовляютъ, распуская 30 золотниковъ сѣрно-кислаго поташу въ полуфунтѣ кипятку и выливая въ ванну.

## ОТВЛЕКАЮЩІЯ ВАННЫ.

Эти ванны большею частію бываютъ тоническія, но названіе отвлекающихъ мы лучше дадимъ *горчичнымъ* ваннамъ.

Ванны сѣрныя, щелочныя, соленыя суть также отвлекающія ванны. Въ одну минуту можно приготовить отвлекающую ванну, прибавя въ обыкновенную ванну шесть или семь горстей горчицы.

Эти ванны особенно полезны для вызыванья скрывшейся отъ холода сыпи. Продолжительность ванны равняется 5—15 минутамъ, но никакъ не болѣе.

# БОЛѢЗНИ,

## ОТЪ КОТОРЫХЪ ПОМОГАЮТЪ ОДНѢ ТРАВЫ.

### Антоновъ огонь.

Трава чесноку конскаго, пить какъ чай; снаружи прикладывать какъ катаплазму.—Хинная корка, въ видѣ порошка (до 1 золот.) или въ видѣ настоя (1 золот. въ 56 золот. воды, въ тепломъ мѣстѣ) 4 раза въ сутки.—Мирра, снаружи для вспрыскиванiй съ известковою водой.—Казацкiй можжевельникъ, для присыпки.—Розмаринъ, для примочекъ (1 золот. вскипятить съ 28 золот. воды).

### Англiйская болѣзнь.

Корень водянаго щавеля, въ видѣ отвара изъ 2 золот.

### Болѣзни накожныя.

Корень мыльнянки; свѣжiе листья щавеля; баккаутное дерево; свѣжая трава дымянки.

### Венерическая болѣзнь.

Коноплянoe и льняное сѣмя, въ видѣ молока; корень змѣевика; баккаутное дерево; корень лобеліи одутлой; стебли сладко-горькаго паслена; сассапарель.

### Веснушки.

Свѣжіе, измятые листья чистотѣла, какъ наружное средство.

### Водяная.

Свѣжій корень безвременника, въ видѣ настоя; бѣлая и черная горчица; истодъ, въ видѣ порошка или отвара; трава и корень одуванчика; морской лукъ, въ видѣ порошка; можжевельникъ, въ видѣ отвара изъ ягодъ; сенега, въ видѣ отвара; сассафрасъ, въ видѣ настоя.

### Воспаленіе легкихъ.

Сенега, въ видѣ отвара или порошка.

### Вялость десенъ.

Гравилатъ, водяный щавель, свѣжая ложечная трава, въ видѣ полосканій.

### Глисты.

Бадьянъ, божья благодать, въ видѣ настоя; глистникъ въ видѣ наливки или порошка; корень папоротника, въ видѣ порошка; полынь; цытварное сѣмя, въ видѣ кашки.

## Дурной запахъ изо рта.

Корень водянаго щавеля, дягиля, змѣевикъ, въ видѣ зубнаго порошка или настоя.

## Жаба.

Дубовая кора, въ видѣ полосканья; льняное сѣмя, для полосканья.

## Золотуха.

Багульникъ, въ видѣ настойки; бѣлокопытникъ, мать и мачиха; анютины глазки, вахта, листья грецкой орѣшины въ видѣ настоя.

## Зубная боль.

Корень гулявицы, въ видѣ порошка; корень слюногона, для полосканья.

## Каменная болѣзнь.

Листья брусники, толокнянки, щавеля, можжевельникъ, морской лукъ, въ видѣ настоя.

## Кашель и охриплость.

Бадьянъ, въ видѣ настоя; мать и мачиха, вероника, винныя ягоды, корень девясила, истодъ, просвирки, проскурнякъ, морковь (сокъ морковный), солодковый корень, яблоки, въ видѣ настоя.

### Колика.

Императорскій (потогонъ) корень, ревень, полынь, въ видѣ настойки.

### Колика отъ вѣтровъ.

Анисовое сѣмя, тысячелистникъ, тминъ, мята, укропное сѣмя, въ видѣ настойки.

### Колотье.

Просвирки, проскурнякъ, сенега, льняное сѣмя, въ видѣ отвара. Употребляется также льняное масло.

### Короста.

Бѣлокопытникъ, вахта, чемерица, девясилъ, сокъ кервельный, одуванчики, въ видѣ примочекъ.

### Костоѣда.

Прострѣлъ, хинная корка, мирра, казацкій можжевельникъ, перувіанскій бальзамъ, въ видѣ примочекъ и катаплазмъ.

### Лихорадка.

Валеріана, кора ветлы, горечавка, гравилатъ, ипекакуана, квассія, полынь, золототысячникъ, иръ, въ видѣ настоя.

## Лишаи.

Вахта, анютины глазки, въ видѣ примочекъ.

## Мозоли.

Чистотѣла свѣжіе, слегка истолченные листья, въ видѣ катаплазмъ; ноготки.

## Нарывы.

Винныя ягоды, лукъ, истодъ, калачики, проскурнякъ, въ видѣ катаплазмъ.

## Поносъ простой.

Змѣевикъ, черника, розмаринъ, коломбо, рисъ, въ видѣ отвара.

## Потеря аппетита.

Кардобенедиктъ, инбирь, калганъ, полынь, въ видѣ настойки.

## Почечуй (геморрой).

Гравилатъ, тысячелистникъ, геморройная трава, въ видѣ настоя.

## Рожа.

Бузинные цвѣты, дубовая кора, сладко-горькій пасленъ, въ видѣ присыпокъ.

## Рвота.

Корица, мушкатный орѣхъ и цвѣтъ, кудрявая мята.

## Судороги.

Бѣлена, дурманъ, піона корень, померанцевые листья.

## Скорбутъ (цынга).

Барбарисъ, вахта, горчица, иръ, можжевельникъ, чеснокъ, хрѣнъ, дымянка, ложечная трава.

## Слабость желудка.

Ирный корень, тысячелистникъ, рута, полынь, трифоль, горчица, гвоздика, дубровка, золототысячникъ, квассія, мята кудрявая, мушкатный орѣхъ и цвѣтъ, померанцы, перецъ, въ видѣ настоя.

## Трещины на губахъ.

Блошное сѣмя, плаунъ, кокосовое масло, въ видѣ мазей.

---

## Угри.

Анютины глазки, шалфей.

## Удушье.

Багульникъ, баккаутъ, гравилатъ, ипекакуана, мята кудрявая, въ видѣ настоя.

## Чахотка.

Перувіанскій и толутанскій бальзамы; бѣлокопытникъ, истодъ, исландскій мохъ, хина, морковь; сладко-горькій пасленъ.

## Чесотка.

Багульникъ, средняя кора и липа, сокъ кервеля, казацкій можжевельникъ, вахта, сладко-горькій пасленъ, свѣжій чистотѣлъ, золототысячникъ, въ видѣ присыпокъ и примочекъ.

## Язвы.

Тысячелистникъ, зеленая скорлупа грецкаго орѣха, потогонъ, лобилія, лаерра, свѣжій щавель, чернильные орѣшки, мыльнянка, вахта, божья благодать, репейный корень, сладко-горькій пасленъ, рута, морковь, ольховые листья, въ видѣ примочекъ, присыпокъ и катаплазмъ.

---

# ПРИБАВЛЕНІЕ.

## БУКОВИЦА ЧЕРНАЯ.

Корень черной буковицы толщиною въ палецъ, на поверхности кольчато-морщинистый и какъ бы узловатый, со множествомъ жилокъ и корешковъ. Стволъ травянистый, четырехъ-угольный, мохнатый, въ полтора фута длиною. Нижніе листья съ длинными стебельками, продолговато-сердцеобразные; верхніе уже, съ короткими стебельками, парные, противоположные. Цвѣтки фіолетово-пурпурные, расположенные въ видѣ продолговатаго колоса.

Черная буковица есть многолѣтнее растеніе во всѣхъ странахъ Европы, кромѣ самыхъ холодныхъ, встрѣчается по тѣнистымъ лѣсамъ и кустарникамъ.

Корни имѣютъ горьковатый, возбуждающій рвоту, вкусъ; листья горьковаты, слегка пряны и солоноваты. Запахъ слабый, не совсѣмъ непріятный.

Употребляется съ пользою въ мокротныхъ болѣзняхъ и атоническихъ катаррахъ или простудахъ. Изъ горсти сухой травы дѣлается настой или отваръ на молокѣ.

## ЧАСТУХА, ВОДЯНОЙ ШИЛЬНИКЪ.

Корень многолѣтній и состоитъ изъ пучка бѣловатыхъ жилокъ. Вышина ствола 2—3 ф.; стволъ голый, прямой, трехъ-угольный, гладкій, вѣствистый сверху въ видѣ метелки. Листья корневые, сидящіе вокругъ ствола, продолговато-сердцеобразные, цѣльные, гладкіе, жилистые; стебельки ихъ длинные, желобковатые. Плодъ трехъ-угольный, состоящій изъ нѣсколькихъ коробочекъ.

Водяной шильникъ растетъ во всей Европѣ, по берегамъ прудовъ, озеръ, ручьевъ, каналовъ, рѣкъ.

Свѣжее растеніе имѣетъ вкусъ водянистый, нѣсколько вяжущій и острый.

Употребляется, въ видѣ порошка, противъ водобоязни.

## НОГОТКИ АПТЕЧНЫЕ.

Корень аптечныхъ ноготковъ состоитъ изъ тонкихъ и сочныхъ жилокъ. Стволъ толстый, вѣтвистый, угловатый или бороздчатый, волосистый, вышиною отъ 1 до 1½ ф. Листья попеременные, сидячіе, почти голые, мясистые, цѣльные; нижніе большіе и лопатчатые, а верхніе малые, почти ланцетовидные, острые. Цвѣты находятся на вершинѣ вѣтвей, желто-оранжевые блестящіе.

Произрастаютъ всюду въ Европѣ.

Запахъ свѣжихъ цвѣтковъ сильный, особенный, довольно тяжелый и нѣсколько одуряющій. Вкусъ цвѣтовъ и листьевъ

кисловато-горьковатый; въ сухомъ состояніи не замѣчается ни вкуса, ни запаха.

Дѣйствіе потогонное, кровегонное, содѣйствующее высыпанью сыпи, противосудорожное и противолихорадочное. Употребляется противъ головокруженія, перемежающихся лихорадокъ, медленнаго высыпанья сыпи, дѣвичьей немочи и золотухи. Внутрь дается водяная настойка изъ 1 горсти цвѣтовъ въ 1 ф. воды. Свѣжій сокъ дается отъ 1 до 4 унцій. Ноготкамъ приписываютъ свойство уничтожать бородавки и мозоли.

## ЗВѢРОБОЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ.

Корень ползучій, жесткій, деревянистый, весьма вѣтвистый, буро-желтоватаго цвѣта. Отъ него идутъ прямые, жесткіе, вѣтвистые, почти цилиндрическіе, голые стволы, въ $1\frac{1}{2}$—2 ф. вышины. Листья малые, сидячіе, попарно противоположные, овально-продолговатые, притупленныя, зеленые, голые, цѣльные. Цвѣтки желтые, небольшіе, расположенные въ видѣ макушекъ на концахъ ствола и вѣтвей.

Звѣробой есть растеніе многолѣтнее, растущее повсюду въ Европѣ, по лѣсамъ, кустарникамъ, лугамъ, оврагамъ и проч. *Запахъ* его легкій, довольно пріятный.

*Вкусъ* горькій, нѣсколько вяжущій и какъ бы солоноватый. Вкусъ сѣменъ горьковато-смоляный, но запаху они не имѣютъ.

Листы, цвѣтки и сѣмена звѣробоя содержатъ много летучаго масла, похожаго на терпентинъ, камедно-смолистый, клейкій и горьковатый сокъ.

Внутрь звѣробой дается для возстановленія регулъ у женщинъ слабыхъ, лимфатическаго сложенія, при бездѣйственномъ состояніи матки. Снаружи звѣробой употребляется при ранахъ; его прикладыватъ въ видѣ мази, бальзама, пластыря, припарки и т. п.

Внутрь звѣробой принимаютъ въ видѣ настойки изъ $3^{1}/_{2}$ зол. цвѣта на $^{1}/_{2}$ ф. воды, или въ видѣ смолистаго экстракта, растореннаго въ водѣ, по $1^{1}/_{2}$ золотника, или же въ видѣ спиртной тинктуры. Летучее масло рѣдко дается внутрь и, въ случаѣ надобности, пріемъ его ограничивается немногими каплями. Если настаивать цвѣтки звѣробоя въ прованскомъ или деревянномъ маслѣ, пока оно не покраснѣетъ, то получится звѣробойное масло, полезное отъ ранъ.

## КРУШИНА СЛАБИТЕЛЬНАЯ.

Отечество Европа; встрѣчается на сырыхъ мѣстахъ, около дорогъ и заборовъ.

Растетъ въ видѣ кустарника съ прямымъ, довольно толстымъ, крѣпкимъ, вѣтвистымъ стволомъ, достигающимъ иногда 2 саженей. Древесина желтоватая; кора гладкая; вѣтви сѣро-буроватыя, нѣсколько развилисгыя, съ шипомъ на концѣ. Листья попеременные, стебельчатые, свѣтло-зеленые, овальные, на концѣ заостренные, а при основаніи почти сердцеобразные, мелко-зубчатые. Плодъ—ягода съ 4 сѣмечками.

Въ зрѣломъ состояніи ягоды слабительной крушины содержатъ весьма сочную зеленую мякоть съ непріятнымъ запахомъ и горькимъ, острымъ и возбуждающимъ тошноту вкусомъ. Ягоды содержатъ зелено-желтоватое красящее вещество, дубильное начало и бѣлковину.

Лубъ крушины также имѣетъ рвотное и слабительное свойство, но употребляется очень рѣдко; ему предпочитаютъ ягоды, которыя при большомъ пріемѣ хотя и производятъ иногда рвоту, однакожъ большею частію дѣйствуютъ на кишечный каналъ, въ коемъ значительно увеличиваютъ слизистыя отдѣленія и червеобразное движеніе. Ягоды и лекарства изъ нихъ употребляются только въ тѣхъ случаяхъ, когда надобно сильно возбудить дѣйствіе кишечнаго канала и произвести въ немъ значительное сотрясеніе, или когда желаютъ отвлечь какую нибудь болѣзнь, напр., лишаи, застарѣлыя накожныя болѣзни, или же наконецъ когда хотятъ дѣйствовать послѣдовательно на все тѣло, напр., при золотухѣ или водяной.

Ягоды даются сами по себѣ, не болѣе 20 штукъ, или въ видѣ сока по 7 золотн. на пріемъ. Порошокъ луба дается до $^3/_4$ золот., или въ видѣ отвара до 2 золот. на $^1/_2$ ф. кипятку.

## Толокнянка.

Многолѣтнее растеніе сѣверныхъ странъ Европы, растущее на холодныхъ, безплодныхъ, песчаныхъ и каменистыхъ мѣстахъ, въ горахъ, въ тѣнистыхъ и возвышенныхъ мѣстностяхъ, и проч.

Толокнянка есть небольшое кустарниковое, ползучее растеніе; стволъ лежащій, вѣтвистый, тонкій, гладкій, отъ 2 до 4 ф. длины; молодые побѣги красноватые и пушистые. Листья попеременные, съ короткими стебельками, продолговато-яйцеобразные, къ верху нѣсколько расширенные, почти тупые, цѣльные, очень гладкіе, блестящіе, толстые, кожистые, сверху темно-зеленые, а снизу посвѣтлѣе.

*Запаху* свѣжее растеніе совсѣмъ не имѣетъ, на сухіе листья его имѣютъ слабый и довольно пріятный запахъ.

*Вкусъ* сперва противный, а потомъ горькій, вяжущій. Кора имѣетъ вкусъ менѣе горькій, но болѣе вяжущій, чѣмъ листья. Ягоды слегка вяжутъ во рту.

Листья толокнянки содержатъ дубильное вещество, слизь, горькое экстрактивное вещество, чернильно-орѣшковую кислоту, смолу, известь и проч.

Дѣйствуетъ хорошо противъ затруднительнаго мочеиспусканья и почечныхъ коликъ, происходящихъ отъ песка, и если не растворяетъ камней, то по крайней мѣрѣ облегчаетъ производимые ими припадки.

Употребляются исключительно листья; ихъ даютъ внутрь или въ видѣ порошка до $^3/_4$ золотн. или въ видѣ настоя, полагая отъ $^3/_4$ до $1^1/_2$ золотн. на 1 ф. кипятку. Ягоды и корни дѣйствуютъ слабѣе.

## ЛОЖЕЧНИКЪ АПТЕЧНЫЙ.

Растетъ во всѣхъ сѣверныхъ, особенно приморскихъ странахъ Европы, на сырыхъ мѣстахъ, по берегамъ морей, рѣкъ и ручьевъ.

Корень веретенообразный, съ тонкими отростками, продолговатый, бѣлый, толщиною въ перо. Стволъ вѣтвистый у основанія, угловатый, голый, отъ ½ до 1 ф. вышины. Листья попеременные; нижніе почти почкообразные, тупые съ каналистымъ стебелькомъ, цѣльные, а верхніе листья продолговатые, сидячіе, вытянутые снизу въ два малыхъ неправильно зубчатыхъ лепестка.

Будучи растираемы между пальцами, свѣжіе листья ложечной травы отличаются сильнымъ и ѣдкимъ запахомъ, который иногда возбуждаетъ чиханіе и слезотеченіе.

*Вкусъ* горькій, раздражающій и острый.

Ложечникъ содержитъ летучее масло съ проницательнымъ запахомъ, дѣйствующее сильно на обоняніе и нервную систему; далѣе, нѣкоторое количество сѣры и азота.

Дѣйствуетъ преимущественно противъ цынготной болѣзни. Ему приписываютъ также возбуждающее, тоническое, мочегонное свойство. Онъ употребляется противъ атоническихъ заваловъ и засореній брюшныхъ внутренностей, въ водяной, ипохондріи, параличѣ, золотухѣ, бѣляхъ, въ застарѣлыхъ болѣзняхъ желудка и легкихъ. Спиртъ изъ ложечника употребляется противъ застарѣлаго ревматизма и различныхъ кожныхъ болѣзней. Какъ мѣстное наружное средство, его прикладываютъ къ атоническимъ кожнымъ ранамъ и молочницѣ. Такъ какъ ложечникъ дѣйствуетъ сильно, то его надобно осторожно давать людямъ, подверженнымъ краснотѣ въ лицѣ, трепетанію членовъ, поносамъ, головной боли, кашлю и кровохарканью. Въ этихъ случаяхъ, его соединяютъ съ молокомъ, сывороткою, телячьимъ бульономъ и т. п.

Обыкновенно употребляютъ сокъ изъ свѣжихъ листьевъ ложечника, отъ 7 до 36 золотн. въ сутки. Чрезъ перегонку ложечника съ корнями хрѣна получается особенно-ѣдкій спиртъ, который дается по 10—12 капель въ противо-цынготныхъ питьяхъ. Можно также настаивать листья ложечника въ водѣ, молокѣ, сывороткѣ, уксусѣ, винѣ, пивѣ, и вообще приготовлять питья, но при этомъ должно помнить, что дѣйствующія начала ложечника очень летучи и пропадаютъ при малѣйшемъ кипяченіи.

## ДЕВЯСИЛЪ НАСТОЯЩІЙ.

Многолѣтнее растеніе во всѣхъ сѣверныхъ и среднихъ странахъ Европы, по краямъ полей, около садовыхъ заборовъ, на лѣсныхъ возвышенныхъ лужайкахъ.

Корень толстый, мясистый, веретено-образный, съ боковыми толстыми отраслями и тонкими корешками, снаружи красновато-бурый, внутри бѣловатый. Стволъ прямой, крѣпкій, вѣтвистый, до 7 ф. вышины. Корневыя листья очень широкіе, съуживающіеся къ стебельку, овально ланцетовидные, зубчатые, сверху зеленые и морщинистые, снизу жилистые, пушистые и бѣловатые; стволовые листья меньше, яйцевидны, заострены, нѣсколько объемлютъ стволъ; тѣ и другіе поперемѣнные. Цвѣтки желтые, большіе и уединенные на концахъ вѣтвей.

*Запахъ* свѣжаго корня сильный, проницательный, а сухаго—напоминаетъ запахъ фіялки.

*Вкусъ* особенный, горьковатый и вмѣстѣ пряный, острый, слизистый.

Содержитъ летучее, легко сгущающееся масло, горькое экстрактивное вещество, кристаллизующуюся смолу, растительную бѣлковину и особый сѣрый пахучій крахмалъ, *инулинъ*, который съ кислотами образуетъ смоляное вещество.

Дѣйствіе его тоническое, возбуждающее.

## ПОТОГОНЪ ОБЫКНОВЕННЫЙ.

Многолѣтнее растеніе, находимое во всѣхъ почти гористыхъ странахъ Европы, въ тѣнистыхъ мѣстахъ.

*Корень* толстый, мѣстами выпуклый и какъ бы узловатый, мясистый, снаружи буровато или желтовато-сѣрый, внутри бѣлый. Стволъ прямой, трубчатый, толстый, гладкій, круглый, дорожчатый, отъ 2 до 3 ф. длины. Листья стебельчатые, состоящіе изъ трехъ почти яйце-образныхъ, зубчатыхъ *лопастей*. Цвѣтки расположены на концѣ ствола въ видѣ большаго зонтика.

*Запахъ* свѣжаго корня сильный благовонный.

*Вкусъ* острый, горькій и непріятный: когда жуютъ его, то онъ щиплетъ языкъ и производитъ въ задней части рта жаръ и сильное отдѣленіе слюны. Будучи проглоченъ, возбуждаетъ желудокъ и раздражаетъ кишки до того, что производитъ отдѣленіе и испражненіе газовъ. Онъ гонитъ также мочу, возбуждаетъ сильную испарину, отдѣленіе слизи и отхаркиванье мокроты. Снаружи употребляется для прикладыванья къ блѣднымъ, атоническимъ язвамъ.

Врутрь корень потогона употребляется самъ по себѣ или въ видѣ настойки.

## ПЕРВОЦВѢТЪ ВЕСЕННІЙ.

Многолѣтнее растеніе во всѣхъ странахъ Европы по лѣсамъ, кустарникамъ и лѣснымъ лужайкамъ.

Корень довольно толстый, буроватый, пахучій, съ боковыми длинными, бѣлыми и мясистыми кореньками. Листья всѣ корневые, морщиноватые, овально-продолговатые, толстые, тупые, болѣе или менѣе пушистые, снизу бѣловатые, зубчатые по краямъ. Изъ средины листовъ выходитъ цвѣтоносъ, оканчивающійся зонтикомъ пахучихъ цвѣтовъ.

*Запахъ* свѣжаго корня благовонный, напоминающій анисъ.

*Вкусъ* нѣсколько вяжущій и горькій. Листья безъ запаху и вкуса. Цвѣтки издаютъ особенный, весьма пріятный и легкій запахъ; вкусъ ихъ сладковато-слизистый.

Первоцвѣту приписываютъ слабое дѣйствіе на нервы. Его употребляютъ въ видѣ настоя, полагая 1 горсть цвѣтовъ на полштофа воды и принимая по чайной чашкѣ.

## МОЖЖЕВЕЛЬНИКЪ ОБЫКНОВЕННЫЙ.

Растетъ во множествѣ по лѣсамъ и кустарникамъ во всѣхъ сѣверныхъ и среднихъ странахъ Европы.

Стволъ прямой или неправильно изогнутый и вообще весьма вѣтвистый, часто отъ самаго низа до вершины. Вѣтви

круглыя, торчащія, шероховатыя, буроватаго цвѣта, съ линейными возвышеніями. Деревесина крѣпкая, нѣсколько красноватая и сухая, съ очень пріятнымъ запахомъ. Листья сидячіе, обыкновенно соединенные по три, узкіе, жесткіе, весьма заостренные, колючіе, сверху нѣсколько желобоватые и неиспадающіе круглый годъ. Плодъ — ягода.

*Запахъ* при сожиганіи смолистый и довольно пріятный.

*Вкусъ* бальзамическій, горьковатый.

Ягоды и древесина доставляютъ желтое и весьма проницательное летучее масло, водяный и смолистый экстракты.

Можжевельникъ употребляется противъ катарровъ мочеваго пузыря и легкаго и противъ прекращенія регулъ. Въ видѣ отвара, дается противъ чесотки, подагры и ревматизма. Треніе отъ запаха, окуренною можжевельникомъ, помогаетъ въ натомической подагрѣ, застарѣломъ ревматизмѣ. Отваръ можжевельника употребляется снаружи для обмыванья вялыхъ язвъ. — Ягоды увеличиваютъ аппетитъ и помогаютъ пищеваренію, возбуждаютъ испарину и гонятъ мочу.

На отваръ берется 7 золотниковъ можжевельника на 1 ф. воды и потомъ уваривается до половины. Масло дается отъ 5 до 20 капель.

## ЗЛАТОЦВѢТЪ МАТОЧНЫЙ.

Многолѣтнее растеніе, находимое почти во всѣхъ странахъ Европы, около стѣнъ, заборовъ, по межамъ, около дорогъ.

Корень веретено-образный очень вѣтвистый и покрытый жилками. Стволъ прямой, жесткій, угловатый, къ верху вѣтвистый, до 2 ф. длины. Листья поперемѣнные, стебельковые, нѣсколько пушистые, зелено-бѣловатаго или пепельнаго цвѣта, довольно широкіе, перистые; листочки ихъ яйце-образные, тупые, перисто-разрѣзные и зубчатые. Цвѣты расположены на концахъ вѣтвей и стволовъ, въ видѣ щитковъ.

*Запахъ* сильный, проницательный и тяжелый, напоминающій нѣсколько запахъ рамашки: дикой рябинки; сухое растеніе почти не имѣетъ запаха.

*Вкусъ* весьма горькій, производящій тошноту.

Дѣйствіе имѣетъ тоническое, возбуждающее нервную систему и особенно матку. Особенно хорошо дѣйствуетъ онъ на матку у женщинъ сыраго сложенія, лѣнивыхъ и тучныхъ, у одержимыхъ дѣвичьею немочью, вообще блѣдныхъ и разслабленныхъ. Златоцвѣтъ можно употреблять и во всѣхъ тѣхъ болѣзняхъ, гдѣ предписывается употребленіе рамашки. Дается въ порошкѣ или въ видѣ настойки, полагая 1½ зол. на 1 ф. воды или вина. Выжатый изъ златоцвѣта сокъ даютъ до 14 золотниковъ въ сутки.

## ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стран.

Сборъ растеній . . . . . . . . . . 1
Стебли и листья . . . . . . . . —
Цвѣты . . . . . . . . . . . —
Плоды . . . . . . . . . . . —
Побѣги . . . . . . . . . . . 2
Корни. . . . . . . . . . . . —
Кора . . . . . . . . . . . . —
Сушенье растеній. . . . . . . . . —
Цвѣты и цвѣтущія верхушки. . . 3
Сѣмена . . . . . . . . . . . —
Плоды . . . . . . . . . . . —
Кора . . . . . . . . . . . . —
Сохраненіе растеній . . . . . . . . —
Время сбора лекарственныхъ растеній. . 4
Классификація растеній по ихъ свойствамъ . 5
Мягчительныя и грудныя . . . . 6
Успокоивающія . . . . . . . . . —
Слабительныя . . . . . . . . . 7
Возбуждающія . . . . . . . . 8
Вяжущія. . . . . . . . . . . 9

Стран.

Тоническія . . . . . . . . . —

Мочегонныя . . . . . . . . . —

Потогонныя . . . . . . . . . 10

Освѣжающія. . . . . . . . . 11

Глистогонныя . . . . . . . . —

Противозолотушныя . . . . . . . —

Приготовленіе настоя. . . . . . . . 12

Холодное настаиванье . . . . . . . —

Отваръ . . . . . . . . . . —

Декоктъ . . . . . . . . . . 13

## ОПИСАНІЕ РАСТЕНІЙ, ИХЪ СВОЙСТВЪ И ДѢЙСТВІЙ.

Авранъ . . . . . . . . . . . —

Александрійскій листъ. . . . . . . . 14

Ангустура . . . . . . . . . . —

Анисъ . . . . . . . . . . . 15

Анютины глазки . . . . . . . . —

Айва . . . . . . . . . . . —

Агарикъ лиственничный. . . . . . . 16

Багульникъ. . . . . . . . . . —

Бадьянъ . . . . . . . . . . —

Базиликъ. . . . . . . . . . . 17

Баккаутъ. . . . . . . . . . . —

Баранчикъ, арника. . . . . . . . —

Барбарисъ . . . . . . . . . . 18

Бедренецъ . . . . . . . . . . —

Стран.

Безвременникъ . . . . . . . . . . . . . 19
Бирючина. . . . . . . . . . . . . 20
Блошное сѣмя . . . . . . . . . . . . —
Бобы св. Игнатія . . . . . . . . . . . —
Богородская трава . . . . . . . . . . 21
Болиголовъ, омега . . . . . . . . . . —
Бузина. . . . . . . . . . . . . . 22
Буккъ . . . . . . . . . . . . . . —
Бычачья трава. . . . . . . . . . . . 23
Бѣлена, блекота. . . . . . . . . . . —
Бѣлокопытникъ, мать и мачиха. . . . . 24
Вахта . . . . . . . . . . . . . . . 25
Вербишникъ, царскій скипетръ . . . . . —
Валеріана, маунъ. . . . . . . . . . . 26
Ваниль. . . . . . . . . . . . . . . —
Верблюжья трава, гунба . . . . . . . 27
Вероника . . . . . . . . . . . . . —
Винная ягода. . . . . . . . . . . . —
Винтерова корка. . . . . . . . . . . 28
Виноградъ. . . . . . . . . . . . . —
Вишня . . . . . . . . . . . . . . —
Вишневый лавръ. . . . . . . . . . . 29
Волчье лыко, волчій перецъ. . . . . . —
Вонючка . . . . . . . . . . . . . 30
Вѣтреница, анемонъ. . . . . . . . . —
Вязовникъ, чернобылъ. . . . . . . . 31
Гальбанъ . . . . . . . . . . . . . —

Стран.

Гвоздика . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Гирча, пустырникъ. . . . . . . . . . . —
Глистникъ. . . . . . . . . . . . . . . . —
Горечавка. . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Горчица черная. . . . . . . . . . . . . 34
—— бѣлая. . . . . . . . . . . . . . —
Гравилатъ, чистецъ. . . . . . . . . . . 35
Гранатное дерево . . . . . . . . . . . . —
Грецкіе орѣхи . . . . . . . . . . . . . . 36
Губка березовая. . . . . . . . . . . . . —
Девясилъ . . . . . . . . . . . . . . . . —
Дерябка . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Дрокъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Донникъ . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Дубъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Дубъ чернильно-орѣшковый . . . . . . —
Дурманъ . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Душица . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Дымянка . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Дягиль вонючій (ангелика). . . . . . . —
Ежевика . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Ель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Жабрей. . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Жатеръ . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Желтникъ ядовитый, сумахъ. . . . . . 42
Жоффрея . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Завязникъ, узикъ . . . . . . . . . . . . —

Стран.

Заря, любистокъ . . . . . . . . . . 43
Заячья кровь, журавецъ . . . . . . . —
Змѣевикъ . . . . . . . . . . . . . —
Золототысячникъ . . . . . . . . . 44
Ибунка . . . . . . . . . . . . . . 45
Ива . . . . . . . . . . . . . . . . —
Игла придорожная, иглица, крушина . . . —
Илимъ . . . . . . . . . . . . . . 46
Инбирь . . . . . . . . . . . . . . —
Инбирь длинный, куркума . . . . . . . —
Индиговое растеніе . . . . . . . . . 47
Ипекакуана . . . . . . . . . . . . —
Иръ, аиръ, касатикъ . . . . . . . . 48
Исландскій мохъ. . . . . . . . . . —
Иссопъ. . . . . . . . . . . . . . 49
Истодъ. . . . . . . . . . . . . . —
Какао . . . . . . . . . . . . . . —
Калачики, просвирнякъ, просвирки . . . . 50
Калганъ . . . . . . . . . . . . . —
Кампешевое дерево. . . . . . . . . . 51
Камфорный лавръ . . . . . . . . . . —
Капуцины, настурція . . . . . . . . 52
Кардамонъ . . . . . . . . . . . . —
Кардобенедикты, крестовый корень . . . —
Каррагенскій мохъ. . . . . . . . . . 53
Каскарилла . . . . . . . . . . . . —
Кассія . . . . . . . . . . . . . . —

Стран.

Катеху . . . . . . . . . . . . 54
Кашкара, сабина . . . . . . —
Каштанъ конскій . . . . . . . . —
Каяпутовое дерево . . . . . . 55
Квассія . . . . . . . . . . . . . . —
Кислецъ . . . . . . . . . . . . . 56
Кишнецъ. . . . . . . . . —
Клещевина . . . . . . . . . . . . —
Коломбо. . . . . . . . . . . . . . —
Колоцинты . . . . . . . . . . . 57
Конопля . . . . . . . . . . . —
Контраерва. . . . . . . . . . . . —
Копай . . . . . . . . . . . . . —
Копытникъ, подорѣшникъ. . . . . 58
Корица . . . . . . . . . . . . . . —
Кофейное дерево . . . . . . . . . 59
Крапива жгучая. . . . . . . . . . 60
Крапъ, марена . . . . . . . . . —
Кротонъ. . . . . . . . . . . . . . —
Кубеба . . . . . . . . . . . . . . 61
Кудрявецъ, марь благовонная. . . . —
Кукольванъ . . . . . . . . . 62
Кукушкины слезы (салепный корень) . . —
Кучеляба, цѣлибуха. . . . . . —
Лаванда . . . . . . . . . . . . . 63
Лавръ. . . . . . . . . . . . . . . —
Ладонъ. . . . . . . . . . . . . . . 64

Стран.

Ландышъ . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Лактукъ . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Ленъ . . . . . . . . . . . . . . . . —
Ленъ кукушкинъ . . . . . . . . . . . 66
Лимонъ. . . . . . . . . . . . . . . . —
Липа. . . . . . . . . . . . . . . . —
Лиственница. . . . . . . . . . . . . . 67
Лихорадочная трава . . . . . . . . . . —
Лобелія одутлая. . . . . . . . . . . —
Ложечная трава . . . . . . . . . . . 68
Ломоносъ . . . . . . . . . . . . . —
Лопушникъ, репейникъ. . . . . . . . . 69
Лукъ . . . . . . . . . . . . . . . . —
Лукъ морской . . . . . . . . . . . . —
Лютикъ . . . . . . . . . . . . . . . 70
Майоранъ. . . . . . . . . . . . . . —
Макъ . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Макъ самосѣйка, дикій. . . . . . . . . 72
Малина . . . . . . . . . . . . . . . —
Мальфы, штокрозы . . . . . . . . . . 73
Маслина, масличное дерево. . . . . . . —
Мастичное дерево. . . . . . . . . . . —
Маточная трава . . . . . . . . . . . 74
Медовка (мелисса). . . . . . . . . . —
Миндальное дерево . . . . . . . . . . —
Мирровое дерево (мирра). . . . . . . . 75
Можжевельникъ . . . . . . . . . . . —

Стран.

Можжевельникъ казацкій . . . . . . . . 76
Молочай . . . . . . . . . . . . . . . —
Морковь . . . . . . . . . . . . . . . —
Мушкатникъ (мушкатный орѣхъ и цвѣтъ) . . 77
Мыльнянка . . . . . . . . . . . . . . —
Наперстянка . . . . . . . . . . . . . 78
Ноготки . . . . . . . . . . . . . . . 79
Овесъ . . . . . . . . . . . . . . . —
Огневица . . . . . . . . . . . . . . —
Огурецъ полевой . . . . . . . . . . . —
Огуречная трава . . . . . . . . . . . 80
Одуванчикъ. . . . . . . . . . . . . . —
Одурь сонная . . . . . . . . . . . . —
Осока песочная (нѣмецкая сассапарель) . . 81
Остролистъ . . . . . . . . . . . . . 82
Папоротникъ . . . . . . . . . . . . . —
Пасленъ сладко-горькій . . . . . . . . 83
Переступень, бріонія. . . . . . . . . —
Перецъ черный . . . . . . . . . . . . 84
— длинный . . . . . . . . . . —
— турецкій . . . . . . . . . . —
Персикъ. . . . . . . . . . . . . . . 85
Перуанникъ (перувіанскій бальзамъ) . . . —
Петрушка . . . . . . . . . . . . . . 86
Піонъ. . . . . . . . . . . . . . . . —
Плаунъ . . . . . . . . . . . . . . . —
Подорожникъ большой . . . . . . . . . 87

Стран.

Полынь . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Померанцевое дерево. . . . . . . . . . 88
Потогонъ (императорскій корень) . . . . . 89
Проскурнякъ (алтея) . . . . . . . . . . —
Прострѣлъ . . . . . . . . . . . . . . . —
Пшеница . . . . . . . . . . . . . . . . 90
— ползучая (пырей) . . . . . . . . . —
Ратанга. . . . . . . . . . . . . . . . . —
Ревень . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Рисъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Рожь . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Роза центифольная . . . . . . . . . . . —
— гальская, провансальская . . . . . —
— мускусная . . . . . . . . . . . . . 93
Розмаринъ . . . . . . . . . . . . . . . —
Ромашка. . . . . . . . . . . . . . . . . 94
— римская. . . . . . . . . . . . . . . —
Росно-ладонное дерево . . . . . . . . . —
Рута . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Рябина дикая . . . . . . . . . . . . . . —
Сабадилла, китайская чемерица. . . . . . —
Саговая пальма . . . . . . . . . . . . . 96
Сандалъ красный . . . . . . . . . . . . —
— желтый . . . . . . . . . . . . . . . 97
Сандараковый кустъ . . . . . . . . . . . —
Сассапарель . . . . . . . . . . . . . . —
Сассафрасъ. . . . . . . . . . . . . . . 98

Стран.

Сафлоръ . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Сенега . . . . . . . . . . . . . . . . —
Симаруба . . . . . . . . . . . . . . . 99
Скаммоній . . . . . . . . . . . . . . —
Слива . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Соколка . . . . . . . . . . . . . . . . —
Солодка (солодковый корень) . . . . . —
Сосна приморская . . . . . . . . . . 101
Сосна . . . . . . . . . . . . . . . . —
Сосна сибирская . . . . . . . . . . . —
Спорынья . . . . . . . . . . . . . . 102
Стиракса . . . . . . . . . . . . . . —
Цареградскій стручечникъ . . . . . . —
Табакъ . . . . . . . . . . . . . . . 103
Тамариндъ . . . . . . . . . . . . . —
Тернъ . . . . . . . . . . . . . . . 104
Тимьянъ (богородская трава, серполетъ) . . —
Тминъ . . . . . . . . . . . . . . . —
— римскій . . . . . . . . . . . . . 105
Толокнянка . . . . . . . . . . . . . —
Толстушка . . . . . . . . . . . . . —
Толутанскій бальзамникъ . . . . . . 106
Трифоль . . . . . . . . . . . . . . —
Трутъ . . . . . . . . . . . . . . . —
Тутовое дерево, шелковица . . . . . 107
Тысячелистникъ . . . . . . . . . . . —
Укропъ . . . . . . . . . . . . . . . —

Стран.

Фасоль . . . . . . . . . . . 108
Фіалка . . . . . . . . . . . —
Фіалковый корень . . . . . . . —
Хинная корка. . . . . . . . . . 109
Хмѣль . . . . . . . . . . . 110
Хрѣнъ . . . . . . . . . . . —
Цикута . . . . . . . . . . . 111
Цытварный корень . . . . . . . . —
Цытварь (цытварное сѣмя) . . . . . . 112
Чемерица . . . . . . . . . . . —
Чернобыльникъ . . . . . . . . . 113
Чеснокъ . . . . . . . . . . . —
— конскій, конскій моіаранъ . . . . 114
Чистецъ . . . . . . . . . . . —
Чистотѣлъ. . . . . . . . . . . —
Щавель. . . . . . . . . . . . 115
— конскій . . . . . . . . . . —
Шалфей . . . . . . . . . . . —
Шандра, конская мята. . . . . . . . 116
Шафранъ . . . . . . . . . . . —
Элеми . . . . . . . . . . . . —
Яблоки . . . . . . . . . . . . 117
Ялаппа . . . . . . . . . . . . —
Ясень манный . . . . . . . . . —
Ячмень . . . . . . . . . . . . 118

## ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ ОТВАРЫ ИЛИ ПИТЬЯ.

Освѣжающіе отвары или питья . . . . . 119

Стран.

Питья, приготовленныя посредствомъ раствореніи или распущенья . . . . . . . . 120

Питье изъ камеди . . . . . . . . —

— — манны . . . . . . . . —

Питье, приготовленныя и настоенныя какъ чай. —

Питье изъ фіялки, царскаго скипетра, золототысячника, дрока, донника, персиковаго цвѣта, бузины, липы, проскурняка, каприфолія, ромашки, дикаго мака, просвирки, гвоздики, иванъ-да-марья, чаю, хмѣля, бѣлокопытника . . . . . . . . —

Питье изъ огуречной травы, чернобыльника, чертополоха, наперстянки, иссопа, будры, мяты, псинки, розмарина, мыльнянки, скабіозы, тмина, грыжной травы, полыни, волосатика, цикорія, дубровки, лаванды, медовки, пролѣски, померанца, руты, шалфея, богородской травы, александрійскаго листа, вероники . . . . . . 121

Питье изъ стеблей . . . . . . . 122

— — корня репейника, спаржи, змѣевика, сальнаго корня, земляники, просвирки, конскаго щавеля, мыльнянки, дягиля, водорослей, цикорія, папоротника, горечавки, ира,

Стран.

хрѣна . . . . . . . . . . 122

Питье, приготовленное посредствомъ холоднаго настаиванья . . . . . . . . 123

Питье изъ квассіи, корней горечавки и сальнаго корня . . . . . . —

Питье, приготовленное посредствомъ отвара: изъ бадьяна, корицы, коріандра, укропа, маковыхъ головокъ, хрѣна, солодки, мыльнянки, змѣевика, валеріаны, репейника, полеваго тмина, сальнаго корня, корсиканскаго моха, истода, хины, ратанги, сассапарели, сассафраса, квассіи. . . . —

Питье, приготовленное посредствомъ декокта 124

Питье изъ чернослива, вишни, палечной травы, финиковъ, винныхъ ягодъ, баккаута, придорожной иглы, щавеля, винограда, дубовой корки, айвы, крахмала, грудныхъ ягодъ, гранатъ, латука, яблокъ, бузины (корки) . . . . . . . . . —

Питье изъ риса, крупъ, ячменя. . . . —

Питья составныя. . . . . . . . . 125

— мягчительныя или грудныя. . . . 126

— противоспазматическія . . . . . 127

— успокоительныя . . . . . . . —

— вяжущія . . . . . . . . . —

Стран.

— Питья послабляющія. . . . . . . . 128
— тоническія. . . . . . . . . —
— возбуждающія. . . . . . . . . —
— мочегонныя . . . . . . . . 129
— потогонныя . . . . . . . . . —
— освѣжающія . . . . . . . . . —
— противоглистныя. . . . . . . . 130
— противозолотушныя . . . . . . . —

## СОКИ И СИРОПЫ.

Соки. . . . . . . . . . . 131
Соки изъ цикорія, огуречной травы, дымянки, щавеля, одуванчика, каприфолія, крессъ-салата, латука, шпината, мыльнянки . . . . . —
Очистительный сокъ изъ травы. . . —
Приготовленіе сироповъ. . . . . . . 132
Сиропъ простой. . . . . . . —
Сиропы составные. . . . . . . . . —
Сиропъ изъ гумми-арабика. . . —
Сиропъ изъ фіялковыхъ цвѣтовъ, ромашки, дикаго мака, гвоздики, каприфолія, просвирки, бѣлокопытника. 133
Сиропъ изъ Иванъ-да-Марья. . . . 134
— мочегонный изъ пяти корней. —
— изъ горечавки, проскурняка, репейника, дягиля, змѣевика и пр. —

Стран.

Сиропъ изъ дымянки, цикорія, крапивы, медовки, водянаго трилистника, иглицы, щавеля и дикой розы . . . . . . . . 135

— изъ спаржевыхъ головокъ, красной капусты, ложечной травы, стѣнницы, омега, крессъ-салата, персиковыхъ цвѣтовъ. —

— изъ хины. . . . . . . . 136

## ЛЕКАРСТВЕННЫЯ ВИНА.

Вино изъ горечавки. . . . . . . . . . —

— хинное. . . . . . . . . . . . 137

Настойка изъ полыни, наперстянки, дубровки, валеріаны, квассіи. . . —

Вино противоцынготное. . . . . . —

Настойка мочегонная. . . . . . . 138

Вино ароматическое. . . . . . . —

## ПИТЬЯ ИЛИ НАПИТКИ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ.

Питье грудное . . . . . . . . . . —

— противъ нервныхъ припадковъ. . . —

— успокоительное. . . . . . . . . 139

— противъ рвоты и тошноты. . . . —

— слабительное . . . . . . . . . —

Стран.

## ПРОМЫВАТЕЛЬНЫЯ.

Мягчительныя промывательныя . . . . . 140
Промыват. изъ отрубной воды. . . . . —
Промыват. изъ крахмала. . . . . —
Промыват. изъ льнянаго сѣмени, корня проскурняка . . . . . . . . —
— съ мягчительными специями; изъ студня, крупы, ячменя, и т. д. 141
Промывательныя противоспазматическія. . . —
Промыват. изъ вонючки. . . . . . —
— съ камфорой. . . . . . —
— изъ валеріаны . . . . . 142
Промывательныя успокоительныя . . . . . —
Промывательныя изъ маковыхъ головокъ. —
— съ лавданомъ . . . . . —
— изъ дикаго мака, исинки. . 143
Промывательныя вяжущія . . . . . . —
Промыват. изъ змѣевика, сальнаго корня. —
— изъ катеху, ратанги, одноцвѣта, корня коломбо . . —
— изъ таннина, изъ квасцовъ. —
— изъ дубовой корки, айвы, рябины, плодовъ шиповника. 144
Промывательныя слабительныя. . . . . —
Промыват. изъ цикорія, вьюнка, пролѣски, чернослива, пырея, тамаринда. 145
— изъ александрійскаго листа. —

Стран

— изъ мыла . . . . . . . —

— маслянистое . . . . . —

— соленое. . . . . . . . —

— изъ сабура . . . . . . —

Промывательныя тоническія. . . . . . . 146

Промыват. изъ хины. . . . . . . . —

— вина . . . . . . . . . . —

Промывательныя глистогонныя . . . . . . —

Промыват. изъ цытварнаго сѣмени, корсиканскаго моха, полыни, чернобыльника, и т. д. . . . . . . —

ПРИМОЧКИ.

Примочки мягчительныя . . . . . . . . 147

Изъ льнянаго сѣмени. . . . . . . .

— мягчительныхъ специй. . . . . —

— корней . . . . . . . . . . —

Успокоительныя . . . . . . . . . 148

Изъ маковыхъ головокъ. . . . . . . —

— успокоительныхъ средствъ . . . —

— листьевъ цсинкп. . . . . . . —

Тоническія или укрѣпляющія

Изъ тоническихъ специй. . . . . . . —

— хины . . . . . . . . . . . . . 149

Разрѣшающія. . . . . . . . . —

Водка камфорная . . . . . . . —

Вода минерально-растительная. . —

Стран.

— вяжущія . . . . . . . . . . —
Изъ дубовой коры, чернильныхъ орѣховъ, корня змѣевика, провансальскихъ розъ и листьевъ орѣшины . . . —
Квасцовая вода. . . . . . . . . . 150
Изъ зеленаго купороса. . . . . . —
— виноградной лозы . . . . . . . . . —

## ПОЛОСКАНЬЯ.

Полосканья мягчительныя. . . . . . . 151
Изъ просвирки. . . . . . . . . —
— винныхъ ягодъ. . . . . . . —
— вяжущія.
Изъ квасцовъ или буры. . . . . 152
разрѣшающія и возбуждающія. —
Изъ горькихъ специй . . . . . . . —
— шалфея . . . . . . . . . —
— хины. . . . . . . . . 153

## ВАННЫ.

*Ванны мягчительныя.*
Изъ отрубей. . . . . . . . . . 154
мягчительныхъ растеній . . . . —
крахмала . . . . . . . . . . 155
*Успокоительныя.*
Изъ псинки . . . . . . . . . . —
листьевъ омега, сонной одури. . —
*Противоспазматическія.*

Страп.

Изъ валеріаны . . . . . . 156

липоваго цвѣта . . . —

*Тоническія.*

Изъ ароматическихъ травъ. . . —

— листьевъ орѣшины. . . . . —

соленыя ванны. . . . . . 157

Изъ дубовой коры, еловыхъ игол, и

— сосновыхъ шишекъ. . . . . . —

щелочныя ванны. . . . . . . . 158

мыльныя ванны. . . . . . . . —

сѣрныя ванны. . . . . . . . . —

отвлекающія . . . . . . . . —

## БОЛѢЗНИ, ОТЪ КОТОРЫХЪ ПОМОГАЮТЪ ОДНѢ ТРАВЫ.

Антоновъ огонь . . . . . . . . . 160

Англійская болѣзнь. . . . . . . . —

Болѣзни накожныя . . . . . . . . —

Венерическая болѣзнь. . . . . . . 161

Веснушки . . . . . . . . . . . —

Водяная . . . . . . . . . . . . —

Воспаленіе легкихъ . . . . . . . —

Глисты . . . . . . . . . . . . —

Дурной запахъ изо рта . . . . . . 162

Жаба . . . . . . . . . . . . . —

Золотуха. . . . . . . . . . . . —

Зубная боль. . . . . . . . . . . —

Стран.


Каменная болѣзнь . . . . . . . . . . 162
Кашель и охриплость . . . . . . . . —
Колика . . . . . . . . . . . . . —
Колика отъ вѣтровъ . . . . . . . . —
Колотье . . . . . . . . . . . . —
Короста . . . . . . . . . . . . —
Костоѣда . . . . . . . . . . . . —
Лихорадка . . . . . . . . . . . —
Лишаи . . . . . . . . . . . . . 164
Мозоли . . . . . . . . . . . . . —
Нарывы . . . . . . . . . . . . . —
Поносъ простой . . . . . . . . . —
Потеря аппетита . . . . . . . . . —
Почечуй (геморрой) . . . . . . . —
Рожа . . . . . . . . . . . . . . 165
Рвота . . . . . . . . . . . . . . —
Судороги . . . . . . . . . . . . —
Скорбутъ (цынга) . . . . . . . . —
Слабость желудка . . . . . . . . —
Трещины на губахъ . . . . . . . —
Угри . . . . . . . . . . . . . . —
Удушье . . . . . . . . . . . . . —
Чахотка . . . . . . . . . . . . . 166
Чесотка . . . . . . . . . . . . . —
Язвы . . . . . . . . . . . . . . —

ПРИБАВЛЕНІЕ.

Буковица черная . . . . . . . . . 167



Первоцвѣтъ весенній.



Можжевельникъ обыкновенный.


Стран.

Частуха, водяной шильникъ. . . . . . . 168
Ноготки аптечные . . . . . . . . . . . —
Звѣробой обыкновенный . . . . . . . 169
Крушина слабительная. . . . . . . . 170
Толокнянки . . . . . . . . . . . . . 171
Ложечникъ аптечный . . . . . . . . 172
Девясилъ настоящій . . . . . . . . 174
Потогонъ обыкновенный . . . . . . . 175
Первоцвѣтъ весенній . . . . . . . . 176
Можжевельникъ обыкновенный. . . . . —
Златоцвѣтъ маточный . . . . . . . . 177



Буковица черная

3



Частуха водяной Шильникъ.



Ноготки аптечные.



Звѣробой проколотой.

6



Крушина слабительная.



Толокнянка настоящая.



Ложечникъ аптечной.



Девясилъ настоящій.

10





Потогонъ обыкновенный.


11



Златоцвѣтъ маточный.


14


382/B


2007334662